

安全に  
使うための

けい し ぶく りょう がん

# 桂枝茯苓丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に桂枝茯苓丸を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 月経不順、月経困難、月経痛
- 下腹部痛
- 月経に伴う精神不安、イライラなど
- 更年期障害
- 産後の体調不良や精神不安
- 肩こり
- めまい
- 頭重
- 打ち身
- しもやけ
- しみ
- 湿疹や皮膚炎
- にきび
- のぼせて足が冷える

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 【参考事項】

- ・漢方の「瘀血（おけつ）」に対応する代表的な処方です。
- ・便秘がある場合は、桃核承気湯の確認票もご覧ください。

## 効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例\*

 ウチダの桂枝茯苓丸 ／ウチダ和漢薬	 オオクサ桂枝茯苓丸 ／大草薬品	 「クラシエ」 漢方桂枝茯苓丸料エキス錠 ／クラシエ薬品	NO IMAGE 桂枝茯苓丸エキス錠OM ／大峰堂薬品工業
NO IMAGE 桂枝茯苓丸ダイコー ／大見生薬	 桂枝茯苓丸料Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬	 桂枝茯苓丸料エキス散 〔勝昌〕 ／東洋薬行	 ケイブクN「コタロー」 ／小太郎漢方製薬
NO IMAGE JPS桂枝茯苓丸料 エキス錠N ／ジェーピーエス製薬	 ツムラ漢方桂枝茯苓丸料 エキス顆粒A ／ツムラ	NO IMAGE トチモトの桂枝茯苓丸料 ／栃本天海堂	NO IMAGE 花扇桂枝茯苓丸 ／小西製薬
 ホノミフクツEX錠 ／劑盛堂薬品	NO IMAGE モリ ビーシャン ／大杉製薬		

\*個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

桂皮、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍薬

## 桂枝茯苓丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	2	2	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない