

安全に  
使うための

さい こ けい し とう

# 柴胡桂枝湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に柴胡桂枝湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

服用はおすすめできません\*

次のような症状がありますか？

- かぜの諸症状：微熱、悪寒（さむけ）、頭痛、倦怠（けんたい）感
- 胃腸の不調の諸症状：胃のむかつき、吐き気、胃痛、胃のつかえ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがしますか？
- 口が苦いとか、口がねばる感じがしますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例\*

NO IMAGE	ウチダの半裏回陽 ／ウチダ和漢薬	 「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯 エキス顆粒A ／クラシエ薬品	 サイケツトN「コタロー」 ／小太郎漢方製薬	 柴胡桂枝湯Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬
	柴胡桂枝湯エキス細粒 〔東洋〕 ／東洋薬行	 柴胡桂枝湯エキス 〔細粒〕23 ／松浦薬業	NO IMAGE	NO IMAGE
	ツムラ漢方柴胡桂枝湯 エキス顆粒A ／ツムラ	NO IMAGE	トチモトの柴胡桂枝湯 ／栃本天海堂	NO IMAGE
	NO IMAGE	NO IMAGE	ハイ・カンボール ／大杉製薬	 ホノミキョウカン錠 ／劑盛堂薬品
	本草柴胡桂枝湯 エキス顆粒-H ／本草製薬			

\* 個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、人参、大棗、甘草、生姜

## 柴胡桂枝湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	2	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない