

安全に
使うための

しゃく やく かん ぞう とう

芍薬甘草湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に芍薬甘草湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

- 心臓に不具合はありますか？
- 腎臓に不具合はありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- こむらがえり
- 筋肉のけいれん、痛み
- 腹痛
- 腰痛

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 血圧はひどく高いですか？
- 足などがむくみやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください







服用後に、手足のだるさ、むくみ、息苦しさを感じたときは、服用を中止して、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないこと

効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例*

NO IMAGE ウチダの解筋止痛湯 (分包) ／ウチダ和漢薬	 「クラシエ」漢方芍薬甘草湯 エキス顆粒 ／クラシエ薬品	 コムレケアa ／小林製薬	 JPS漢方顆粒-20号 ／ジェーピーエス製薬
 芍薬甘草湯エキス 〔細粒〕34 ／松浦薬業	 芍薬甘草湯エキス細粒G 「コタロー」 ／小太郎漢方製薬	 芍薬甘草湯エキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬	 芍薬甘草湯エキス散(勝昌) ／東洋薬行
 ツムラ漢方芍薬甘草湯 エキス顆粒 ／ツムラ	NO IMAGE ツラレス ／ロート製薬	NO IMAGE トチモトの芍薬甘草湯 ／栃本天海堂	 ドルチェ顆粒 ／阪本漢法製薬
 本草芍薬甘草湯 エキス顆粒-H ／本草製薬			

* 個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
 - 生後3ヵ月未満の乳児。
 - 次の診断を受けた人。 心臓病
- 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

芍薬、甘草

芍薬甘草湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
2	2	2	2	2

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない