

安全に
使うための

とう き しゃく やく さん

当帰芍薬散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に当帰芍薬散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 月経不順、月経異常、月経痛 | <input type="checkbox"/> 頭重、肩こり、腰痛、耳鳴り |
| <input type="checkbox"/> 更年期障害 | <input type="checkbox"/> 足腰の冷え、しもやけ |
| <input type="checkbox"/> めまい・立ちくらみ | <input type="checkbox"/> むくみ、しみ |
| <input type="checkbox"/> 産前産後あるいは流産による諸症状：貧血、疲労倦怠（けんたい）感、めまい、むくみ | |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱

充実／わからない

- 冷えを感じやすいですか？
 貧血ぎみですか？
 疲れやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例*

NO IMAGE	ウチダの当帰芍薬散 ／ウチダ和漢薬		カイケツEP錠 ／劑盛堂薬品		クラシエ当帰芍薬散錠 ／クラシエ薬品	NO IMAGE	JPS当帰芍薬散料 エキス錠N ／ジェーピーエス製薬
	大正 当帰芍薬散エキス錠 ／大正製薬		ツムラ漢方当帰芍薬散料 エキス顆粒 ／ツムラ	NO IMAGE	当帰芍薬散錠OM ／大峰堂薬品工業		当帰芍薬散料Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬
	当帰芍薬散料エキス 〔細粒〕44 ／松浦薬業		当帰芍薬散料エキス散 〔勝昌〕 ／東洋薬行		トウシャンN「コタロー」 ／小太郎漢方製薬	NO IMAGE	トチモトの当帰芍薬散料 ／栃本天海堂
	ナリピタン 当帰芍薬散錠 ／小林製薬	NO IMAGE	モリ エーション ／大杉製薬		涌出（顆粒） ／建林松鶴堂		養命酒製造 当帰芍薬散料 エキス錠 ／養命酒製造
NO IMAGE	ルナエール ／ロート製薬						

* 個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、川芎、芍薬、茯苓、白朮または蒼朮、沢瀉

当帰芍薬散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	0	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない