001 安中散

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ケイヒ	ケイシ	エンゴサク	ボレイ	ウイキョウ	シュクシャ	カンゾウ	リョウキョウ
1	2022年9月改訂 （第1版）	**オースギ安中散料エキスG** 大杉製薬	16100AMZ03900000 1986年10月	3.0	1.0	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－05	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 294g（1.0g×294包）［分包］ 84g（1.0g×84包）［分包］	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
2	2022年9月改訂 （第1版）	**オースギ安中散料エキスＴ錠** 高砂薬業 大杉製薬	16100AMZ04185000 1986年10月	2.79 （9錠）	1.0	結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色5号、青色1号、赤色3号	フィルムコーティング錠	SG－05T	A	食前又は食間 2～3回	882錠（3錠×294包）［分包］ 252錠（3錠×84包）［分包］	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	1.0
3	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ安中散料エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03845000 1986年10月	6.0	1.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-5 （内容量3.0g） EK-5 （内容量2.0g）	A	食前又は食間 2～3回	〈KB-5〉 3.0g×28包［分包］ 3.0g×168包［分包］ 〈EK-5〉 2.0g×42包［分包］ 2.0g×294包［分包］ 500g［ボトル］	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
4	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー安中散エキスカプセル** 小太郎漢方製薬	16100AMZ04022000 1986年10月	2.04 （6ｶﾌﾟｾﾙ）	1.5	カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、合成ケイ酸アルミニウム、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルスターチ、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カプセル本体に青色1号、黄色5号、赤色3号、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム	カプセル	NC5	A	食前又は食間 2～3回	300カプセル（10カプセル×30） ［PTP］ 600カプセル（10カプセル×60） ［PTP］	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
5	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー安中散エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03970000 1986年10月	6.0	1.5	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N5	B	食前又は食間 2～3回	500g［ポリ瓶、バラ］ 2.0g×42包［分包］ 2.0g×231包［分包］	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
6	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ安中散料エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16200AMZ00558000 1987年10月	7.5	0.8	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-05	A	食前又は食間 2～3回	750g（2.5g×300包） 105g（2.5g×42包）	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
7	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03289000 1986年10月	7.5	1.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／5	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
8	2023年10月改訂 （第1版）	**〔東洋〕安中散料エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00400000 1987年1月	6.0	3.0	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-001	A	空腹時 3回	500g［ボトル］ 2.0g×252包［分包］		3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	2023年9月改訂 （第1版）	**本草安中散料エキス顆粒－Ｍ** 本草製薬	16100AMZ04132000 1986年10月	7.5	1.0	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H05	A	食前又は食間 3回	500g（バラ包装）［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	4.0		3.0	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5

【効能又は効果一覧】

A	やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があって、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症： 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー
B	冷え症、神経質で、胃痛や胸やけのあるもの。 胃腸病、胃炎、胃酸過多症、胃潰瘍による胃痛。