040 啓脾湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ニンジン	ビャクジュツ	ソウジュツ	ブクリョウ	レンニク	サンヤク	サンザシ	チンピ	タクシャ	カンゾウ
1	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16200AMZ00576000 1987年10月	7.5	4.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ／128	A	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	3.0		4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
2	2023年11月改訂 （第1版）	**〔東洋〕啓脾湯エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00478000 1987年12月	7.5	4.8	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-035	A	空腹時 3回	500g[ボトル] 2.5g×252包[分包]	3.0	4.0		4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A	やせて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症： 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢