048 五苓散

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 タクシャ	タクシャ末	チョレイ	チョレイ末	ブクリョウ	ブクリョウ末	ソウジュツ	ソウジュツ末	ビャクジュツ	ケイヒ	ケイシ	ケイヒ末
1	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ五苓散料エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ04218000 1986年10月	6.0	2.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-17 （内容量3.0g） EK-17 （内容量2.0g）	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-17〉 3.0g×28包[分包] 3.0g×168包[分包] 〈EK-17〉 2.0g×42包[分包] 2.0g×294包[分包] 500g[ボトル]	5.0		3.0		3.0				3.0	2.0		
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ五苓散料エキス錠** 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00646000 1987年12月	5.94 （18錠）	2.3	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	EKT-17	A-1	食前又は食間 2～3回	252錠（3錠×6連包×14シート）[分包] 1,764錠（3錠×6連包×98シート）[分包]	5.0		3.0		3.0				3.0	2.0		
3	2024年11月改訂 （第2版）	**コタロー五苓散料エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ04229000 1986年10月	6.0	3.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N17	B	食前又は食間 2～3回	500g [ボリ瓶、バラ] 2.0g×42包[分包] 2.0g×231包[分包]	6.0		4.5		4.5				4.5	2.5		
4	2025年11月改訂 （第2版）	**三和五苓散料エキス細粒** 三和生薬	16100AMZ03629000 1986年11月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-33	C	食前又は食間 3回	500ｇ［ボトル］ 2.5ｇ×300包［分包］	6.0		4.5		4.5				4.5	3.0		
5	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16100AMZ04661000 1987年10月	7.5	2.4	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-17	A-1	食前又は食間 2～3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	6.0		4.5		4.5		4.5			3.0		
6	2024年1月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬 大杉製薬	16100AMZ04661000 1987年10月	7.5	2.4	乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	SG-17	A-1	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 735g（2.5g×294包）[分包]	6.0		4.5		4.5		4.5			3.0		
7	2022年9月改訂 （第1版）	**ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00365000 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC17	A-2	食前又は食間 2～3回	126g（1.5g×84包）[分包]	6.0		4.5		4.5				4.5	3.0		
8	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の五苓散料エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16200AMZ00177000 1987年10月	6.0	3.14	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-17	A-1	食前又は食間 3回	500g［ボトル］ 2.0g×84包［分包］ 2.0g×315包［分包］	6.0		4.5		4.5				4.5	3.0		
9	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03287000 1986年10月	7.5	2.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／17	D	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 5kg（500g×10） [パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	4.0		3.0		3.0		3.0			1.5		
10	2023年11月改訂 （第1版）	**〔東洋〕五苓散料エキス細粒** 東洋薬行	16200AMY00397000 1988年10月	6.0	3.0	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY-043	A-1	空腹時 3回	500g[ボトル] 2.0g×252包[分包]	5.0		3.0		3.0				3.0		2.0	
11	2023年9月改訂 （第1版）	**本草五苓散顆粒－Ｒ** 本草製薬	15500AMZ00603000 1981年8月	5.0	0*	乳糖水和物、カルメロースカルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	顆粒	H17	A-1	食前 2回	150g（2.5g×60包）[分包]		0.8		0.6		0.6		0.6				0.4

＊：生薬末(3.0g/日)を用いた製剤であり、
エキス製剤でないため

【効能又は効果一覧】

A-1	のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ
A-2	のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭重、むくみ
B	咽喉がかわいて、水を飲むにも拘らず、尿量減少するもの、頭痛、頭重、頭汗、悪心、嘔吐、あるいは浮腫を伴うもの。 急性胃腸カタル、小児・乳児の下痢、宿酔、暑気当り、黄疸、腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル。
C	口渇、めまい、頭痛、浮腫などのあるものの次の諸症 急性胃腸カタル、はきけ、ネフローゼ
D	口渇、尿量減少するものの次の諸症： 浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病