056 三黄瀉心湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ダイオウ	生薬組成 オウゴン	生薬組成 オウレン
1	2022年3月改訂 （第1版）	**オースギ三黄瀉心湯エキスＧ** 大杉製薬	16100AMZ04807000 1987年10月	3.0	1.4	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－113	A-2	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 294g（1.0g×294包）[分包] 84g（1.0g×84包）[分包]	3.0	3.0	3.0
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03849000 1986年10月	6.0	0.7	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-13 （内容量3.0g） EK-13 （内容量2.0g）	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-13〉 3.0g×28包[分包] 3.0g×168包[分包] 〈EK-13〉 2.0g×42包[分包] 2.0g×294包[分包] 500g[ボトル]	2.0	1.0	1.0
3	2023年1月改訂 （第1版）	**コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル** 小太郎漢方製薬	16100AMZ04028000 1986年10月	0.84 (3ｶﾌﾟｾﾙ)	0.6	カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、合成ケイ酸アルミニウム、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルスターチ、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カプセル本体に青色1号、黄色5号、赤色3号、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム	カプセル	NC113	B	食前又は食間 2～3回	600カプセル[ポリ瓶、バラ] 300カプセル （10カプセル×30）[PTP] 600カプセル （10カプセル×60）[PTP]	1.0	1.0	1.0
4	2023年1月改訂 （第1版）	**コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル** 小太郎漢方製薬 扶桑薬品工業	16100AMZ04028000 1992年12月	0.84 (3ｶﾌﾟｾﾙ)	0.6	カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、合成ケイ酸アルミニウム、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルスターチ、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カプセル本体に青色1号、黄色5号、赤色3号、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム	カプセル	FS113	B	食前又は食間 2～3回	500カプセル （10カプセル×50）[PTP]	1.0	1.0	1.0
5	2023年1月改訂 （第1版）	**コタロー三黄瀉心湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03953000 1986年10月	6.0	0.6	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N113	C	食前又は食間 2～3回	500g[ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包[分包] 2.0g×231包[分包]	1.0	1.0	1.0
6	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ三黄瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16100AMZ04659000 1987年10月	2.5	0.7	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-113	A-1	食前又は食間 1回	750g（2.5g×300包） 105g（2.5g×42包）	1.0	1.0	1.0
7	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16100AMZ03853000 1986年11月	4.5	0.6	乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-113	A-1	食前又は食間 3回	500g［ボトル］ 1.5g×84包［分包］ 1.5g×336包［分包］	2.0	1.0	1.0
8	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03283000 1986年10月	7.5	1.75	日局カルメロースカルシウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／113	A-1	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 5kg（500g×10）［パウチ］ 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	3.0	3.0	3.0
9	2023年9月改訂 （第1版）	**本草三黄瀉心湯エキス顆粒－Ｍ** 本草製薬	16100AMZ04148000 1986年10月	7.5	0.7	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H13	A-1	食前又は食間 3回	500g（バラ包装）［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	2.0	1.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A-1	比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症
A-2	比較的体力があり、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安で便秘の傾向のあるもの： 高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症
B	のぼせて不安感があり、胃部がつかえて便秘がひどいもの、あるいは充血または出血の傾向を伴うもの。 高血圧症、動脈硬化症、脳溢血、下血、鼻出血、常習便秘。
C	のぼせて精神不安があり、胃部がつかえて、便秘がひどいもの、あるいは鮮紅色の充血、出血の傾向を伴うもの。 高血圧、動脈硬化、高血圧による不眠症、脳溢血、吐血、下血、鼻出血、常習便秘。