# 070 十全大補湯

| | 添付文書の作成又は改訂年月 | 商品名<br>製造販売元<br>発売元又は販売元 | 承認番号<br>販売開始年月 | 一日製剤量（g） | 一日エキス量（g） | 添加物 | 剤形 | 識別コード（商品番号等） | 効能又は効果 | 用法及び用量 | 包装 | 生薬組成 ニンジン | オウギ | ビャクジュツ | ソウジュツ | ブクリョウ | トウキ | シャクヤク | ジオウ | センキュウ | ケイヒ | カンゾウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年6月改訂<br>（第1版） | **オースギ十全大補湯エキスG**<br>大杉製薬 | 16100AMZ03884000<br>1986年10月 | 12.0 | 6.1 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | SG－48 | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g[ボトル]<br>1.176g(4.0g×294包)[分包]<br>336g(4.0g×84包)<br>[分包] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 2 | 2023年10月改訂<br>（第1版） | **クラシエ十全大補湯エキス細粒**<br>大峰堂薬品工業<br>クラシエ薬品 | 21900AMX00623000<br>1986年10月 | 7.5 | 6.2 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素 | 細粒 | KB-48<br>(内容量3.75g)<br>EK-48<br>(内容量2.5g) | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 〈KB-48〉<br>3.75g×28包[分包]<br>3.75g×168包[分包]<br>〈EK-48〉<br>2.5g×42包[分包]<br>2.5g×294包[分包]<br>500g[ボトル] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 3 | 2023年7月改訂<br>（第1版） | **コタロー十全大補湯エキス細粒**<br>小太郎漢方製薬 | 16100AMZ03811000<br>1986年10月 | 15.0 | 8.5 | ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | 細粒 | N48 | C | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g[ポリ瓶、バラ]<br>2.5g×189包[分包] | 2.5 | 2.5 | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | 2025年11月改訂(第2版) | **三和十全大補湯エキス細粒**<br>三和生薬 | 16100AMZ03605000<br>1986年11月 | 9.0 | 6.1 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸 | 細粒 | S-32 | B | 食前又は食間<br>3回 | 500ｇ［ボトル］<br>3.0ｇ×300包［分包］ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 5 | 2023年12月改訂<br>（第1版） | **三和十全大補湯エキス細粒**<br>三和生薬<br>ジェーピーエス製薬 | 16100AMZ03605000<br>1986年11月 | 9.0 | 6.1 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸 | 細粒 | J－48 | B | 食前又は食間<br>3回 | 720ｇ(3.0ｇ×240 包)[分包] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 6 | 2022年6月改訂<br>（第1版） | **ジュンコウ十全大補湯FCエキス細粒 医療用**<br>康和薬通<br>大杉製薬 | 16100AMY00375000<br>1986年10月 | 7.5 | 5.35 | トウモロコシデンプン、乳糖水和物 | 細粒 | FC48 | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 210g(2.5g×84包)<br>[分包] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | 2023年12月改訂<br>（第1版） | **ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）**<br>ツムラ | 16100AMZ01124000<br>1986年10月 | 7.5 | 5.0 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物 | 顆粒 | ツムラ／48 | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g[ボトル]<br>5kg(500g×10)<br>[パウチ]<br>2.5g×42包[分包]<br>2.5g×189包[分包] | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 8 | 2023年11月改訂<br>（第1版） | **〔東洋〕十全大補湯エキス細粒**<br>東洋薬行 | 16100AMY00392000<br>1987年1月 | 9.0 | 5.7 | トウモロコシデンプン<br>(賦形剤) | 細粒 | TY-060 | A | 空腹時<br>3回 | 500g[ボトル]<br>3.0g×252包[分包] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 9 | 2022年10月改訂<br>（第1版） | **本草十全大補湯エキス顆粒－M**<br>本草製薬 | 16100AMZ04162000<br>1986年10月 | 9.0 | 6.1 | 乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | H48 | A | 食前又は食間<br>3回 | 500g(バラ包装)<br>[ボトル]<br>882g(3.0g×294包)<br>[分包]<br>126g(3.0g×42包)<br>[分包] | 2.5 | 2.5 | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |

【効能又は効果一覧】

| | |
|---|---|
| A | 病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血 |
| B | 貧血して皮膚および可視粘膜が蒼白で、栄養不良、痩せていて食欲がなく衰弱しているものの次の諸症<br>衰弱(産後、手術後、大病後)などの貧血症、低血圧症、白血病、痔瘻、カリエス、消耗性疾患による衰弱、出血、脱肛 |
| C | 皮膚および粘膜が蒼白で、つやがなく、やせて貧血し、食欲不振や衰弱がはなはだしいもの。消耗性疾患、あるいは手術による衰弱、産後衰弱、全身衰弱時の次の諸症。<br>低血圧症、貧血症、神経衰弱、疲労倦怠、胃腸虚弱、胃下垂。 |