087 清心蓮子飲

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 レンニク	バクモンドウ	ブクリョウ	ニンジン	シャゼンシ	オウゴン	オウギ	ジコッピ	カンゾウ
1	2023年2月改訂 （第1版）	**ジュンコウ清心蓮子飲FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00417000 1986年10月	6.0	4.2	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC111	A	食前又は食間 2～3回	168g(2.0g×84包）［分包］	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
2	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ01147000 1986年10月	7.5	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／111	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5
3	2023年10月改訂 （第1版）	**〔東洋〕清心連子飲エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00409000 1986年12月	7.5	5.0	トウモロコシデンプン（賦形剤）	細粒	TY－072	B	空腹時 3回	500g［ボトル］ 2.5g×252包［分包］	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A	全身倦怠感があり、口や舌が渇き、尿が出しぶるものの次の諸症： 残尿感、頻尿、排尿痛
B	全身倦怠感があり、口や舌が渇き、尿が出しぶるものの次の諸症： 残尿感、排尿痛