126 茯苓飲

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
												ブクリョウ	ビャクジュツ	ソウジュツ	ニンジン	ショウキョウ	チンピ	キジツ
1	2024年10月改訂 （第2版）	**コタロー茯苓飲エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03837000 1986年10月	6.0	3.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N69	A	食前又は食間 2～3回	500g[ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包[分包] 2.0g×231包[分包]	5.0	4.0		3.0	0.8	3.0	1.5
2	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ01130000 1986年10月	7.5	2.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／69	B	食前又は食間 2～3回	500g[ボトル] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	5.0		4.0	3.0	1.0	3.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A	胃部がつかえて膨満感があり、胃液の分泌が過多で悪心、嘔吐や食欲不振があって尿量減少するもの。 胃炎、胃下垂、胃アトニー、胃神経症、胃拡張、溜飲症、消化不良。
B	吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症： 胃炎、胃アトニー、溜飲