127 茯苓飲合半夏厚朴湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成								
												ブクリョウ	ソウジュツ	ニンジン	ショウキョウ	チンピ	キジツ	ハンゲ	コウボク	ソヨウ
1	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ03266000 1986年10月	7.5	4.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ／116	A	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	5.0	4.0	3.0	1.0	3.0	1.5	6.0	3.0	2.0

【効能又は効果一覧】

A	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎