128 附子理中湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ニンジン	加工ブシ	ブシ	カンキョウ	カンゾウ	ビャクジュツ
1	2025年9月改訂 （第2版）	**三和附子理中湯エキス細粒** 三和生薬	16100AMZ03614000 1986年11月	4.5	2.8	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファ一化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-09	A	食前又は食間 3回	500g［ボトル］ 1.5g×300包［分包］	3.0	1.0		3.0	3.0	3.0
2	2023年10月改訂 （第1版）	**三和附子理中湯エキス細粒** 三和生薬 クラシエ薬品	16100AMZ03614000 1986年11月	4.5	2.8	日局乳糖水和物、日局トウモロコシデンプン、日局結晶セルロース、日局軽質無水ケイ酸、部分アルファ一化デンプン	細粒	EK-410	A	食前又は食間 3回	1.5g×42包［分包］ 1.5g×294包［分包］ 500g［ボトル］	3.0		1.0	3.0	3.0	3.0

【効能又は効果一覧】

A	胃腸虚弱で血色悪く、顔に生気なく、尿量多く手足に冷感あり、下痢の傾向あり、しばしばはき気、めまい、頭重、胃痛をうったえるものの次の諸症 慢性の胃腸カタル、胃アトニー症