# 136 麻杏薏甘湯

| | 添付文書の作成又は改訂年月 | 商品名<br>製造販売元<br>発売元又は販売元 | 承認番号<br>販売開始年月 | 一日製剤量（g） | 一日エキス量（g） | 添加物 | 剤形 | 識別コード（商品番号等） | 効能又は効果 | 用法及び用量 | 包装 | 生薬組成 マオウ | キョウニン | ヨクイニン | カンゾウ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年4月改訂<br>（第1版） | **オースギ麻杏薏甘湯エキスＧ**<br>大杉製薬 | 16100AMZ03892000<br>1986年10月 | 4.5 | 1.3 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | SG－78 | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g［ボトル］<br>441g（1.5g×294包）［分包］<br>126g（1.5g×84包）［分包］ | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |
| 2 | 2023年10月改訂<br>（第1版） | **クラシエ麻杏薏甘湯エキス細粒**<br>大峰堂薬品工業<br>クラシエ薬品 | 21900AMX00628000<br>1986年10月 | 6.0 | 1.6 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素 | 細粒 | KB-78<br>（内容量3.0g）<br>EK-78<br>（内容量2.0g） | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 〈KB-78〉<br>3.0g×28包［分包］<br>3.0g×168包［分包］<br>〈EK-78〉<br>2.0g×42包［分包］<br>2.0g×294包［分包］<br>500g［ボトル］ | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |
| 3 | 2023年1月改訂<br>（第1版） | **コタロー麻杏薏甘湯エキス細粒**<br>小太郎漢方製薬 | 16100AMZ03838000<br>1986年10月 | 6.0 | 4.0 | ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | 細粒 | N78 | B | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g［ポリ瓶、バラ］<br>2.0g×42包［分包］<br>2.0g×231包［分包］ | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |
| 4 | 2025年11月改訂<br>（第2版） | **三和麻杏薏甘湯エキス細粒**<br>三和生薬 | 16100AMZ03599000<br>1986年11月 | 4.5 | 2.6 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸 | 細粒 | S-36 | C | 食前又は食間<br>3回 | 500ｇ［ボトル］<br>1.5ｇ×300包［分包］ | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |
| 5 | 2023年12月改訂<br>（第1版） | **ＪＰＳ麻杏薏甘湯エキス顆粒〔調剤用〕**<br>ジェーピーエス製薬 | 16100AMZ04765000<br>1988年8月 | 7.5 | 2.4 | ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物 | 顆粒 | J-78 | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g<br>750g(2.5g×300包)<br>105g(2.5g×42包) | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |
| 6 | 2023年12月改訂<br>（第1版） | **ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒(医療用)**<br>ツムラ | 16100AMZ03293000<br>1986年10月 | 7.5 | 3.0 | 日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物 | 顆粒 | ツムラ／78 | A | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g［ボトル］<br>5kg（500g×10）［パウチ］<br>2.5g×42包［分包］<br>2.5g×189包［分包］ | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |

【効能又は効果一覧】

| | |
|---|---|
| A | 関節痛、神経痛、筋肉痛 |
| B | 関節・筋肉リウマチ、神経痛、イボ。 |
| C | 筋肉リウマチ、関節リウマチ、いぼ、手掌角化症 |