147 苓桂朮甘湯

	添付文書の作成又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日製剤量（g）	一日エキス量（g）	添加物	剤形	識別コード（商品番号等）	効能又は効果	用法及び用量	包装	生薬組成 ブクリョウ	ビャクジュツ	ソウジュツ	ケイヒ	ケイシ	カンゾウ
1	2022年10月改訂 （第1版）	**オースギ苓桂朮甘湯エキスＴＧ** 大杉製薬	16100AMZ04188000 1986年10月	4.5	1.6	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG－39	A-1	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 441g（1.5g×294包）［分包］ 126g（1.5g×84包）［分包］	6.0	3.0		4.0		2.0
2	2023年10月改訂 （第1版）	**クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒** クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ03576000 1986年10月	6.0	1.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-39 （内容量3.0g） EK-39 （内容量2.0g）	A-1	食前又は食間 2～3回	〈KB-39〉 3.0g×28包［分包］ 3.0g×168包［分包］ 〈EK-39〉 2.0g×42包［分包］ 2.0g×294包［分包］ 500g［ボトル］	6.0	3.0		4.0		2.0
3	2023年7月改訂 （第1版）	**コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒** 小太郎漢方製薬	16100AMZ03843000 1986年10月	6.0	1.7	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N39	B	食前又は食間 2～3回	500g［ポリ瓶、バラ］ 2.0g×42包［分包］ 2.0g×231包［分包］	6.0	3.0		4.0		2.0
4	2025年10月改訂 （第2版）	**三和苓桂朮甘湯エキス細粒** 三和生薬	16100AMZ03621000 1986年11月	4.5	1.7	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファ一化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-16	C	食前又は食間 3回	500ｇ［ボトル］ 1.5ｇ×300包［分包］	6.0	3.0		4.0		2.0
5	2023年12月改訂 （第1版）	**ＪＰＳ苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕** ジェーピーエス製薬	16100AMZ04769000 1987年10月	7.5	1.8	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-39	A-1	食前又は食間 2～3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	6.0		3.0	4.0		2.0
6	2022年10月改訂 （第1版）	**ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス細粒 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00361000 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC39	A-2	食前又は食間 2～3回	126g（1.5g×84包）［分包］	6.0	3.0		4.0		2.0
7	2022年10月改訂 （第1版）	**ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス錠 医療用** 康和薬通 大杉製薬	16200AMY00018000 2020年6月	4.5 （15錠）	2.25	トウモロコシデンプン、乳糖水和物、タルク、ステアリン酸マグネシウム	錠剤	FC39T	A-2	食前又は食間 2～3回	420錠（5錠×84包）［分包］	6.0	3.0		4.0		2.0
8	2024年2月改訂 （第1版）	**太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒** 太虎精堂製薬	16100AMZ03909000 1986年11月	6.0	2.56	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-39	A-1	食前又は食間 3回	500g［ボトル］ 2.0g×84 包［分包］ 2.0g×315 包［分包］	6.0	3.0		4.0		2.0
9	2023年12月改訂 （第1版）	**ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）** ツムラ	16100AMZ01121000 1986年10月	7.5	1.5	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ／39	A-1	食前又は食間 2～3回	500g［ボトル］ 5kg（500g×10）［パウチ］ 2.5g×42包［分包］ 2.5g×189包［分包］	6.0		3.0	4.0		2.0
10	2023年10月改訂 （第1版）	**〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒** 東洋薬行	16100AMY00393000 1986年12月	6.0	3.0	トウモロコシデンプン （賦形剤）	細粒	TY-110	A-1	空腹時 3回	500g［ボトル］ 2.0g×252包［分包］	6.0	3.0			4.0	2.0
11	2022年9月改訂 （第1版）	**本草苓桂朮甘湯エキス顆粒－Ｍ** 本草製薬	16100AMZ04137000 1986年10月	7.5	1.6	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H39	A-1	食前又は食間 3回	500g（バラ包装）［ボトル］ 735g（2.5g×294包）［分包］ 105g（2.5g×42包）［分包］	6.0	3.0		4.0		2.0

【効能又は効果一覧】

A-1	めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症： 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛
A-2	めまい、ふらつきまたは動悸があり、尿量が減少するものの次の諸症： 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛
B	立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。 神経性心悸亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。
C	頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心悸亢進などがあって不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるものの次の諸症 神経性心悸亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患