

006 温清飲

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成							
												トウキ	ジオウ	シヤクヤク	センキユウ	オウレン	オウゴン	サンシシ	オウバク
1	2018年2月改訂 (第3版)	オースギ温清飲エキスG 大杉製薬	(61AM)第3878号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.3	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-57	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	2018年2月改訂 (第4版)	クラシエ温清飲エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00626000 2007年7月 2007年7月	6.0	4.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-57 3.0g EK-57 2.0g	A-2	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
3	2018年2月改訂 (第10版)	コタロー温清飲エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3948 1986年10月 1986年10月	12.0	6.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N57	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 4.0g×147包(588g) 4.0g×42包(168g)	4.0	4.0	3.0	3.0	1.5	3.0	2.0	1.5
4	2018年2月改訂 (第6版)	ジュンコウ温清飲FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00418000 1986年10月 1986年10月	7.5	5.1	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 57	A-3	食前又は食間 2~3回	210g(2.5g×84包)	4.0	4.0	4.0	4.0	1.5	3.0	2.0	1.5
5	2018年2月改訂 (第9版)	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3256 1986年10月 1986年10月	7.5	3.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/57	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
6	2018年2月改訂 (第11版)	テイコク温清飲エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3692 1987年10月 1987年10月	9.0	4.41	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 57 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
7	2018年2月改訂 第9版	【東洋】温清飲エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0398 1986年10月 1987年1月	6.0	3.6	トウモロコシデンブ	細粒	TY-005	A-2	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5
8	2018年2月改訂 (第8版)	本草 温清飲エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4156号 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H57	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	3.0	3.0	1.5	3.0	2.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる： 月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症
A-2	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症： 月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症
A-3	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症： 月経不順、月経困難症、血の道症、更年期障害、神経症