

032 桂枝加朮附湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成										
												ケイ ヒ	シャク ヤク	タイ ソウ	シヨウ キョウ ウ	カン ゾウ	ソウ ジュツ	加工 ブシ	ブシ	ブシ 末	ブシ 末 2 子 末	
1	2009年9月改訂 (第6版、「指定医 薬品」の規制区分 廃止による削除)	コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM) 3816 1986年10月 1986年10月	9.0	5.3	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N18	B	食前又は食間 2~3回	500g 3.0g×168包(504g) 3.0g×42包(126g)	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0				1.0	
2	2018年3月改訂 (第5版)	三和桂枝加朮附湯エキス細粒 三和生薬	(61AM) 3608 1986年10月 1986年11月	9.0	5.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファヘ化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-03	C	食前又は食間 3回	500g 3.0g×300包	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0	1.0				
3	2009年6月改訂 (第4版、薬事法改 正に伴う削除(販売 制度改訂))	J P S 桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4768 1987年10月 1987年10月	7.5	5.0	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-18)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0				1.0	
4	2007年5月改訂 (第4版、自主改訂)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM) 1138 1986年10月 1986年10月	7.5	3.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/18	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0				0.5	
5	2017年8月改訂 (第8版)	テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM) 3699 1987年10月 1987年10月	7.5	2.54	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 18 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0				0.5	
6	2016年4月改訂 (第4版)	マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM) 第4172号 1986年10月 1986年10月	6.0	4.0	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	18, マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0	1.0				

【効能又は効果一覧】

A	関節痛、神経痛
B	冷え症で痛み、四肢に麻痺感があるもの、あるいは屈伸困難のもの。 神経痛、関節炎、リウマチ。
C	悪寒をおぼえ尿快通せず、四肢の屈伸が困難なもの次の諸症 急性および慢性関節炎、関節リウマチ、神経痛、偏頭痛