

040 啓脾湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成									
												ニンジン	ビャクジュツ	ソウジュツ	ブクリヨウ	レンニク	サンヤク	サンザシ	チンピ	タクシャ	カンゾウ
1	2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16200AMZ00576000 1987年10月	7.5	4.75	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/128	A	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	3.0	/	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
2	2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00478000 1987年12月	7.5	4.8	トウモロコシデンブ (賦形剤)	細粒	TY-035	A	空腹時 3回	500g[ボトル] 2.5g×252包[分包]	3.0	4.0	/	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A	やせて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症： 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢
---	-------------------------------------------------------