

048 五苓散

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成											
											タクシヤ	タクシヤ末	チヨレイ	チヨレイ末	ブクリヨウ	ブクリヨウ末	ソウジュツ	ソウジュツ末	ピヤクジュツ	ケイヒ	ケイシ	ケイヒ末
1 2018年11月改訂 (第4版)	クラシエ五苓散料エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)4218 2007年7月 2007年7月	6.0	2.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-17 3.0g EK-17 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	5.0	/	3.0	/	3.0	/	/	/	3.0	2.0	/	/
2 2018年11月改訂 (第4版)	クラシエ五苓散料エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00646000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	2.3	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-17)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート) 1,764錠(3錠×6連包×98シート)	5.0	/	3.0	/	3.0	/	/	/	3.0	2.0	/	/
3 2014年2月改訂 (第6版)	コタロー五苓散料エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)4229 1986年10月 1986年10月	6.0	3.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N17	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	2.5	/	/
4 2019年3月改訂 (第4版)	三和五苓散料エキス細粒 三和生薬	(61AM)3629 1986年10月 1986年11月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-33	C	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	3.0	/	/
5 2014年2月改訂 (第4版、自主改訂)	JPS五苓散料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	61AM-4661 1987年10月 1987年10月	7.5	2.4	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-17)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	6.0	/	4.5	/	4.5	/	4.5	/	3.0	/	/	/
6 2014年2月改訂 (第4版、自主改訂)	JPS五苓散料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬 大杉製薬	(61AM)第4661号 1987年10月 1987年10月	7.5	2.4	乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム、シヨ糖脂肪酸エステル	顆粒	(SG-17)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包)	6.0	/	4.5	/	4.5	/	4.5	/	3.0	/	/	/
7 2016年12月改訂 (第4版)	ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00365000 1986年10月 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 17	A-3	食前又は食間 2~3回	126g(1.5g×84包)	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	3.0	/	/
8 2014年2月改訂 (第5版、自主改訂)	太虎堂の五苓散料エキス顆粒 太虎精堂製薬	(62AM)0177 1987年10月 1987年10月	6.0	3.14	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-17	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.0g×84包 2.0g×315包	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	3.0	/	/
9 2014年10月改訂 (第6版)	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3287 1986年10月 1986年10月	7.5	2.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/17	D	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	/	3.0	/	3.0	/	3.0	/	1.5	/	/	/
10 2017年8月改訂 (第7版)	テイコク五苓散エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3866 1988年7月 1988年7月	7.5	1.69	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 17 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	5.0	/	3.0	/	3.0	/	/	/	3.0	2.0	/	/
11 2014年2月改訂 第5版	【東洋】五苓散料エキス細粒 東洋薬行	(62AMY)0397 1988年7月 1988年10月	6.0	3.0	トウモロコシデンブ	細粒	TY-043	A-1	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	5.0	/	3.0	/	3.0	/	/	/	3.0	2.0	/	/
12 2014年2月改訂 (第6版)	本草 五苓散顆粒-R 本草製薬	(55AM)第603号 1981年8月 1981年8月	5.0	0*	乳糖水和物、カルメロースカルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	顆粒	H17	A-1	食前 2回	2.5g×60包	/	0.8	/	0.6	/	0.6	/	0.6	/	/	/	0.4
13 2016年4月改訂 (第6版)	マツウラ五苓散料エキス顆粒 松浦薬業	(62AM)第585号 1987年10月 1987年10月	4.5	2.4	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	17、マツウラ (分包品)	A-2	食前又は食間 2~3回	500g 1.5g×84包 1.5g×300包	5.0	/	3.0	/	3.0	/	/	/	3.0	2.0	/	/

\*：生薬末(3.0g/日)を用いた製剤であり、エキス製剤でないため

【効能又は効果一覧】

A-1	のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ
A-2	のどが乾いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ
A-3	のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭重、むくみ
B	咽喉がかわいて、水を飲むにも拘らず、尿量減少するもの、頭痛、頭重、頭汗、悪心、嘔吐、あるいは浮腫を伴うもの。 急性胃腸カタル、小児・乳児の下痢、宿酔、暑気当り、黄疸、腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル。
C	口渇、めまい、頭痛、浮腫などのあるものの次の諸症 急性胃腸カタル、はきけ、ネフローゼ
D	口渇、尿量減少するものの次の諸症： 浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病