

048 五苓散

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成											
											タク シヤ	タク シヤ 末	チ ヨ レイ	チ ヨ レイ 末	ブ ク リ ヨ ウ	ブ ク リ ヨ ウ 末	ソ ウ ジュ ツ	ソ ウ ジュ ツ 末	ビ ヤ ク ジュ ツ	ケ イ ヒ	ケ イ シ	ケ イ ヒ 末
1 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ五苓散料エキス細粒 クラシエ クラシエ薬品	16100AMZ04218000 1986年10月	6.0	2.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-17 (内容量3.0g) EK-17 (内容量2.0g)	A-1	食前又は食間 2~3回	<KB-17> 3.0g×28包【分包】 3.0g×168包【分包】 <EK-17> 2.0g×42包【分包】 2.0g×294包【分包】 500g【ボトル】	5.0	/	/	/	/	/	/	/	3.0	2.0	/	/
2 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ五苓散料エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00646000 1987年12月	5.94 (18錠)	2.3	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	EKT-17	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート)【分包】 1,764錠(3錠×6連包×98シート)【分包】	5.0	/	/	/	/	/	/	/	3.0	2.0	/	/
3 2023年7月改訂 (第1版)	コタロー五苓散料エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ04229000 1986年10月	6.0	3.2	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N17	B	食前又は食間 2~3回	500g 【ポリ瓶、バラ】 2.0g×42包【分包】 2.0g×231包【分包】	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	2.5	/	/
4 2022年10月改訂 (第1版)	三和五苓散料エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03629000 1986年11月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファ化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-33	C	食前又は食間 3回	500g【ボトル】 2.5g×300包【分包】	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	3.0	/	/
5 2023年12月改訂 (第1版)	JPS五苓散料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	16100AMZ04661000 1987年10月	7.5	2.4	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-17	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	6.0	/	4.5	/	4.5	/	4.5	/	3.0	/	/	/
6 2024年1月改訂 (第1版)	JPS五苓散料エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬 大杉製薬	16100AMZ04661000 1987年10月	7.5	2.4	乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	SG-17	A-1	食前又は食間 2~3回	500g【ボトル】 735g(2.5g×294包) 【分包】	6.0	/	4.5	/	4.5	/	4.5	/	3.0	/	/	/
7 2022年9月改訂 (第1版)	ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00365000 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC17	A-2	食前又は食間 2~3回	126g(1.5g×84包) 【分包】	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	3.0	/	/
8 2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の五苓散料エキス顆粒 太虎精堂製薬	16200AMZ00177000 1987年10月	6.0	3.14	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-17	A-1	食前又は食間 3回	500g【ボトル】 2.0g×84包【分包】 2.0g×315包【分包】	6.0	/	4.5	/	4.5	/	/	/	4.5	3.0	/	/
9 2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ五苓散料エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ03287000 1986年10月	7.5	2.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/17	D	食前又は食間 2~3回	500g【ボトル】 5kg(500g×10) 【パウチ】 2.5g×42包【分包】 2.5g×189包【分包】	4.0	/	3.0	/	3.0	/	3.0	/	1.5	/	/	/
10 2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕五苓散料エキス細粒 東洋薬行	16200AMY00397000 1988年10月	6.0	3.0	トウモロコシデンブ(賦形剤)	細粒	TY-043	A-1	空腹時 3回	500g【ボトル】 2.0g×252包【分包】	5.0	/	3.0	/	3.0	/	/	/	3.0	2.0	/	/
11 2023年9月改訂 (第1版)	本草五苓散顆粒-R 本草製薬	15500AMZ00603000 1981年8月	5.0	0*	乳糖水和物、カルメロースカルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	顆粒	H17	A-1	食前 2回	150g(2.5g×60包) 【分包】	/	0.8	/	0.6	/	0.6	/	0.6	/	/	/	0.4

\*：生薬末(3.0g/日)を用いた製剤であり、エキス製剤でないため

【効能又は効果一覧】

A-1	のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ
A-2	のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴うもの次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭重、むくみ
B	咽喉がかわいて、水を飲むにも拘らず、尿量減少するもの、頭痛、頭重、頭汗、悪心、嘔吐、あるいは浮腫を伴うもの。 急性胃腸カタル、小児・乳児の下痢、宿酔、暑気あたり、黄疸、腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル。
C	口渇、めまい、頭痛、浮腫などのあるもの次の諸症 急性胃腸カタル、はきけ、ネフローゼ
D	口渇、尿量減少するもの次の諸症： 浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病