

056 三黄瀉心湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成		
												ダイ オウ	オウ ゴン	オウ レン
1	2011年2月改訂 (第2版、薬食安指 示に伴う改訂)	オースギ三黄瀉心湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第4807号 1987年10月 1987年10月	3.0	1.4	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸 マグネシウム	顆粒	SG-113	A-2	食前又は食間 2~3回	500g 294g(1.0g×294包) 84g(1.0g×84包)	3.0	3.0	3.0
2	2011年2月改訂 (第3版、薬食安指 示による改訂)	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3849 2007年7月 2007年7月	6.0	0.7	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロー ス、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-13 3.0g EK-13 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	2.0	1.0	1.0
3	2011年2月改訂 (第5版)	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬	(61AM)4028 1986年10月 1986年10月	0.84 (3カプセル)	0.6	カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セ ルロース、合成ケイ酸アルミニウム、ステアリン酸 マグネシウム、トウモロコシデンブ、ヒドロキシ プロピルスターチ、メタケイ酸アルミン酸マグネシ ウム、カプセル本体に青色1号、黄色5号、赤色3号、 酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム	カプセル	NC113	B	食前又は食間 2~3回	300カプセル(PTP) 600カプセル(PTP) 600カプセル	1.0	1.0	1.0
4	2011年2月改訂 (第5版)	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル 小太郎漢方製薬 扶桑薬品工業	(61AM)4028 1986年10月 1992年12月	0.84 (3カプセル)	0.6	カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セ ルロース、合成ケイ酸アルミニウム、ステアリン酸 マグネシウム、トウモロコシデンブ、ヒドロキシ プロピルスターチ、メタケイ酸アルミン酸マグネシ ウム、カプセル本体に青色1号、黄色5号、赤色3号、 酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム	カプセル	FS113	B	食前又は食間 2~3回	500カプセル(10カプセル×50)	1.0	1.0	1.0
5	2011年2月改訂 (第6版)	コタロー三黄瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3953 1986年10月 1986年10月	6.0	0.6	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ ン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	細粒	N113	C	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	1.0	1.0	1.0
6	2011年2月改訂 (第4版、薬食安指 示に伴う改訂)	JPS三黄瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4659 1987年10月 1987年10月	2.5	0.7	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和 物	顆粒	(J-113)	A-1	食前又は食間 1回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	1.0	1.0	1.0
7	2011年2月改訂 (第4版、薬食安指 示による改訂)	太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3853 1986年10月 1986年11月	4.5	0.6	乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-113	A-1	食前又は食間 3回	500g 1.5g×84包 1.5g×336包	2.0	1.0	1.0
8	2011年2月改訂 (第6版、薬食安指 示による改訂)	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3283 1986年10月 1986年10月	7.5	1.75	日局カルボキシメチルセルロースカルシウム、日局 ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/113	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0
9	2017年8月改訂 (第7版)	テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3676 1987年10月 1987年10月	7.5	1.21	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネ シウム	顆粒	TEIKOKU 113 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	3.0	3.0	3.0
10	2011年2月改訂 (第5版)	本草 三黄瀉心湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4148号 1986年10月 1986年10月	7.5	0.7	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、 ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H13	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	2.0	1.0	1.0
11	2016年4月改訂 (第5版)	マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4220号 1987年10月 1987年10月	3.0	1.0	ヒプロメロース、マクロゴール6000、乳糖水和物、 デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	113, マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 1g×84包 1g×300包	2.0	1.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A-1	比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症
A-2	比較的体力があり、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安で便秘の傾向のあるもの： 高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症
B	のぼせて不安感があり、胃部がつかえて便秘がひどいもの、あるいは充血または出血の傾向を伴うもの。 高血圧症、動脈硬化症、脳溢血、下血、鼻出血、常習便秘。
C	のぼせて精神不安があり、胃部がつかえて、便秘がひどいもの、あるいは鮮紅色の充血、出血の傾向を伴うもの。 高血圧、動脈硬化、高血圧による不眠症、脳溢血、吐血、下血、鼻出血、常習便秘。