

068 芍薬甘草湯

|   | 添付文書の作成<br>又は改訂年月    | 商品名<br>製造販売元<br>発売元又は販売元              | 承認番号<br>薬価基準収載年月<br>販売開始年月              | 一日<br>製剤量<br>(g) | 一日<br>エキス量<br>(g) | 添加物  | 剤形 | 識別コード<br>(商品番号等)         | 効能又は<br>効果 | 用法及び用量         | 包装   | 生薬組成  |      |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|-------------------|--|----|--------------------------|------------|----------------|--|-------|------|
|   |                      |                                       |   |                  |                   |  |    |                          |            |                |  | シヤクヤク | カンゾウ |
| 1 | 2014年4月改訂<br>(第6版)   | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒<br>クラシエ製薬<br>クラシエ薬品    | (61AM) 3505<br>2007年7月<br>2007年7月       | 6.0              | 2.9               | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素          | 細粒 | KB-68 3.0g<br>EK-68 2.0g | A          | 食前又は食間<br>2～3回 | 3.0g×28包<br>3.0g×168包<br>2.0g×42包<br>2.0g×294包<br>500g | 6.0   | 6.0  |
| 2 | 2014年4月改訂<br>(第12版)  | コタロー芍薬甘草湯エキス細粒<br>小太郎漢方製薬             | (61AM) 3808<br>1986年10月<br>1986年10月     | 6.0              | 2.5               | ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | 細粒 | N68                      | A          | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g<br>2.0g×231包(462g)<br>2.0g×42包(84g)               | 5.0   | 5.0  |
| 3 | 2016年12月改訂<br>(第7版)  | ジュンコウ芍薬甘草湯FCエキス細粒 医療用<br>康和薬通<br>大杉製薬 | 16000AMY0041400<br>1986年10月<br>1986年10月 | 4.5              | 2.0               | トウモロコシデンブ、乳糖水和物                                    | 細粒 | FC 68                    | A          | 食前又は食間<br>2～3回 | 126g(1.5g×84包)   | 6.0   | 6.0  |
| 4 | 2016年10月改訂<br>(第12版) | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)<br>ツムラ             | (61AM) 1139<br>1986年10月<br>1986年10月     | 7.5              | 2.5               | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物                             | 顆粒 | ツムラ/68                   | A          | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g<br>2.5g×42包<br>2.5g×189包                          | 6.0   | 6.0  |
| 5 | 2017年8月改訂<br>(第12版)  | テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒<br>帝國漢方製薬<br>帝國製薬      | (61AM) 3672<br>1988年7月<br>1988年7月       | 7.5              | 2.65              | 乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム                         | 顆粒 | TEIKOKU 68<br>(分包品に表示)   | A          | 食前<br>3回       | 500g<br>2.5g×42包<br>2.5g×252包                          | 6.0   | 6.0  |
| 6 | 2014年4月改訂<br>第12版    | 【東洋】芍薬甘草湯エキス細粒<br>東洋薬行                | (61AMY) 0388<br>1986年10月<br>1986年12月    | 4.5              | 2.4               | トウモロコシデンブ  | 細粒 | TY-059                   | A          | 空腹時<br>3回      | 500g<br>1.5g×336包                                      | 6.0   | 6.0  |
| 7 | 2014年4月改訂<br>(第8版)   | 本草 芍薬甘草湯エキス顆粒-M<br>本草製薬               | (61AM) 第4138号<br>1986年10月<br>1986年10月   | 7.5              | 2.4               | 乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム                | 顆粒 | H68                      | A          | 食前又は食間<br>3回   | 500g<br>2.5g×294包<br>2.5g×42包                          | 6.0   | 6.0  |
| 8 | 2016年4月改訂<br>(第9版)   | マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒<br>松浦薬業                | (61AM) 第4040号<br>1987年10月<br>1987年10月   | 6.0              | 軟エキス<br>6.0*      | ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ            | 顆粒 | 68, マツウラ<br>(分包品)        | A          | 食前又は食間<br>2～3回 | 500g<br>2g×84包<br>2g×300包                              | 6.0   | 6.0  |
| 9 | 2016年8月作成<br>(第2版)   | マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒<br>松浦薬業<br>ジェービーエス製薬   | (61AM) 第4040号<br>1987年10月<br>1987年10月   | 6.0              | 軟エキス<br>6.0*      | ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ            | 顆粒 | J-68, JPS<br>(分包品)       | A          | 食前又は食間<br>2～3回 | 2g×300包  | 6.0   | 6.0  |

\* : 乾燥エキス3.0g相当

【効能又は効果一覧】

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | 急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛 |
|---|---------------------------------|