

070 十全大補湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成											
											ニン ジン	オウ ギ	ビヤ クジ ユツ	ソウ ジュ ツ	ブク リヨ ウ	トウ キ	シャ クヤ ク	ジ オウ	セン キユ ウ	ケイ ヒ	カン ゾウ	
1 2005年10月作成	オースギ十全大補湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3884号 1986年10月 1986年10月	12.0	6.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-48	A	食前又は食間 2~3回	500g 1,176g(4.0g×294包) 336g(4.0g×84包)	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
2 2012年1月改訂 (第3版、日局収載 に伴う改訂)	クラシエ十全大補湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00623000 2007年7月 2007年7月	7.5	6.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-48 3.75g EK-48 2.5g	A	食前又は食間 2~3回	3.75g×28包 3.75g×168包 2.5g×42包 2.5g×294包 500g	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
3 2012年1月改訂 (第5版)	コタロー十全大補湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3811 1986年10月 1986年10月	15.0	8.5	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N48	C	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×189包(472.5g)	2.5	2.5	3.5	/	3.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	1.0
4 2012年6月改訂 (第4版)	三和十全大補湯エキス細粒 三和生薬	61AM第3605 1986年10月 1986年11月	9.0	6.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファ化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-32	B	食前又は食間 3回	500g 3g×300包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
5 2018年3月改訂 (第5版)	三和十全大補湯エキス細粒 三和生薬 ジェービーエス製薬	61AM-3605 1986年10月 1986年11月	9.0	6.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファ化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	(J-48)	B	食前又は食間 3回	500g 720g(3.0g×240包)	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
6 2017年5月改訂 (第4版)	ジュンコウ十全大補湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00375000 1986年10月 1986年10月	7.5	5.35	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 48	A	食前又は食間 2~3回	210g(2.5g×84包)	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7 2014年10月改訂 (第7版)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1124 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/48	A	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
8 2017年8月改訂 (第7版)	テイコク十全大補湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3693 1987年10月 1987年10月	9.0	4.36	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 48 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
9 2005年7月改訂 第5版	〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0392 1986年10月 1987年1月	9.0	5.7	トウモロコシデンプン	細粒	TY-060	A	空腹時 3回	500g 3.0g×252包	3.0	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
10 2011年7月改訂 (第4版)	本草 十全大補湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4162号 1986年10月 1986年10月	9.0	6.1	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H48	A	食前又は食間 3回	500g 3.0g×294包 3.0g×42包	2.5	2.5	3.5	/	3.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A	病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
B	貧血して皮膚および可視粘膜が蒼白で、栄養不良、痩せていて食欲がなく衰弱しているものの次の諸症 衰弱(産後、手術後、大病後)などの貧血症、低血圧症、白血病、痔瘻、カリエス、消耗性疾患による衰弱、出血、脱肛
C	皮膚および粘膜が蒼白で、つやがなく、やせて貧血し、食欲不振や衰弱がはなはだしいもの。消耗性疾患、あるいは手術による衰弱、産後衰弱、全身衰弱時の次の諸症。 低血圧症、貧血症、神経衰弱、疲労倦怠、胃腸虚弱、胃下垂。