

070 十全大補湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成											
											ニンジン	オウギ	ビャクジュツ	ソウジュツ	ブクリヨウ	トウキ	シヤクヤク	ジオウ	センキユウ	ケイヒ	カンゾウ	
1 2022年6月改訂 (第1版)	オースギ十全大補湯エキスG 大杉製薬	16100AMZ03884000 1986年10月	12.0	6.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-48	A	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 1,176g (4.0g×294包) [分包] 336g (4.0g×84包) [分包]	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
2 2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ十全大補湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00623000 1986年10月	7.5	6.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-48 (内容量3.75g) EK-48 (内容量2.5g)	A	食前又は食間 2~3回	<KB-48> 3.75g×28包 [分包] 3.75g×168包 [分包] <EK-48> 2.5g×42包 [分包] 2.5g×294包 [分包] 500g [ボトル]	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
3 2023年7月改訂 (第1版)	コタロー十全大補湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ03811000 1986年10月	15.0	8.5	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N48	C	食前又は食間 2~3回	500g [ポリ瓶、バラ] 2.5g×189包 [分包]	2.5	2.5	3.5		3.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	1.0
4 2022年6月改訂 (第1版)	三和十全大補湯エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03605000 1986年11月	9.0	6.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファ化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-32	B	食前又は食間 3回	500g [ボトル] 3.0g×300包 [分包]	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
5 2023年12月改訂 (第1版)	三和十全大補湯エキス細粒 三和生薬 ジェーピーエス製薬	16100AMZ03605000 1986年11月	9.0	6.1	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファ化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	J-48	B	食前又は食間 3回	720g (3.0g×240包) [分包]	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
6 2022年6月改訂 (第1版)	ジュンコウ十全大補湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00375000 1986年10月	7.5	5.35	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC48	A	食前又は食間 2~3回	210g (2.5g×84包) [分包]	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7 2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ01124000 1986年10月	7.5	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/48	A	食前又は食間 2~3回	500g [ボトル] 5kg (500g×10) [パウチ] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包]	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
8 2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00392000 1987年1月	9.0	5.7	トウモロコシデンプン(賦形剤)	細粒	TY-060	A	空腹時 3回	500g [ボトル] 3.0g×252包 [分包]	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
9 2022年10月改訂 (第1版)	本草十全大補湯エキス顆粒-M 本草製薬	16100AMZ04162000 1986年10月	9.0	6.1	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H48	A	食前又は食間 3回	500g (バラ包装) [ボトル] 882g (3.0g×294包) [分包] 126g (3.0g×42包) [分包]	2.5	2.5	3.5		3.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	1.0

【効能又は効果一覧】

A	病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
B	貧血して皮膚および可視粘膜が蒼白で、栄養不良、痩せていて食欲がなく衰弱しているものの次の諸症 衰弱(産後、手術後、大病後)などの貧血症、低血圧症、白血病、痔瘻、カリエス、消耗性疾患による衰弱、出血、脱肛
C	皮膚および粘膜が蒼白で、つやがなく、やせて貧血し、食欲不振や衰弱がはなはだしいもの。消耗性疾患、あるいは手術による衰弱、産後衰弱、全身衰弱時の次の諸症。 低血圧症、貧血症、神経衰弱、疲労倦怠、胃腸虚弱、胃下垂。