

071 十味敗毒湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成												
											サイ コ	オウ ヒ	ボク ソク	キキ ヨウ	セン キユウ	ブク リヨウ	ドク カツ	ボウ フウ	ハマ ボウフウ	カン ゾウ	シヨウ ウキヨウ	生 シヨウ ウキヨウ	ケイ ガイ
1	2009年6月改訂 (第2版、自主改訂) オースギ十味敗毒湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第4808号 1987年10月 1987年10月	6.0	2.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-06	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 588g(2.0g×294包) 168g(2.0g×84包)	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	2.0	/	2.0	1.0	0.25	/	1.0
2	2013年10月改訂 (第4版、日局収載 に伴う改訂) クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3867 2007年7月 2007年7月	6.0	3.9	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-6 3.0g EK-6 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	2.5	2.5	/	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	/	1.5	1.0	/	1.5
3	2013年10月改訂 (第4版、日局収載 に伴う改訂) クラシエ十味敗毒湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00634000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-6)	A-2	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包 ×14シート) 1,764錠(3錠×6連包 ×98シート)	2.5	2.5	/	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	/	1.5	1.0	/	1.5
4	2013年6月改訂 (第7版) コタロー十味敗毒湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3955 1986年10月 1986年10月	6.0	3.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N6	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	2.0	/	2.0	1.0	0.3	/	1.0
5	2014年6月改訂 (第4版) 三和十味敗毒湯エキス細粒 三和生薬	61AM第3617 1986年10月 1986年11月	7.5	3.7	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-25	C	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	1.5	/	1.5	1.0	1.0	/	1.0
6	2012年9月改訂 (第5版) JPS十味敗毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	62AM-0478 1987年10月 1987年10月	7.5	2.6	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-06)	A-2	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	2.5	2.5	/	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	/	1.5	1.0	/	1.5
7	2011年8月改訂 (第5版) 太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3914 1986年10月 1986年11月	7.5	4.04	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-6	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	/	1.0	1.0	/	1.0
8	2009年6月改訂 (第5版) ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1151 1986年10月 1986年10月	7.5	3.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/6	A-2	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	/	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	/	1.0	1.0	/	1.0
9	2017年8月改訂 (第8版) テイコク十味敗毒湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3653 1987年10月 1987年10月	9.0	4.4	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 6 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	/	1.0	1.0	/	1.0
10	2015年4月改訂 第8版 〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 東洋薬行	(61AM)0457 1987年10月 1987年12月	6.0	4.0	トウモロコシデンブ	細粒	TY-061	A-1	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	3.0	3.0	/	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	/	1.0	/	3.0	1.0
11	2014年2月改訂 (第6版) 本草十味敗毒湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4140号 1986年10月 1986年10月	7.5	4.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H06	A-2	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	2.5	2.5	/	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	/	1.5	1.0	/	1.5
12	2016年4月改訂 (第5版) マツウラ十味敗毒湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4341号 1992年7月 1992年10月	7.5	4.0	軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、トウモロコシデンブ、リン酸水素Ca、カルメロースCa	顆粒	6.マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×84包 2.5g×300包	2.5	2.5	/	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	/	1.5	1.0	/	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	化膿性皮膚疾患、急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫
A-2	化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫
B	腫物、湿疹、ジンマ疹、にきび、フルンクロージスの体質改善。
C	比較的神経質で胸脇苦満があり癩、アレルギー性の湿疹などを起し易い体質のものの次の諸症 皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、乳房炎、フルンクロージスの体質改善、腫物、尋常性痤瘡、とびひ