

077 小半夏加茯苓湯

| | 添付文書の作成 又は改訂年月 | 商品名 製造販売元 発売元又は販売元 | 承認番号 販売開始年月 | 一日 製剤量 (g) | 一日 エキス量 (g) | 添加物 | 剤形 | 識別コード (商品番号等) | 効能又は 効果 | 用法及び用量 | 包装 | 生薬組成 | | |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--|----|--|------------|----------------|--|------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | ハンゲ | シヨウキョウ | ブクリョウ |
| 1 | 2022年12月改訂 (第1版) | オースギ小半夏加茯苓湯エキスG 大杉製薬 | 20200AMZ00790000 1992年7月 | 3.0 | 0.9 | 乳糖水和物、トウモロコシデンブ、 ステアリン酸マグネシウム | 顆粒 | SG-21 | A-2 | 食前又は食間 2~3回 | 500g [ボトル] 294g (1.0g×294包) [分包] 84g (1.0g×84包) [分包] | 8.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 2023年10月改訂 (第1版) | クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 クラシエ クラシエ薬品 | 16100AMZ04215000 1986年10月 | 6.0 | 1.7 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局 結晶セルロース、日局乳糖水和物、含 水二酸化ケイ素 | 細粒 | KB-21 (内容量3.0g) EK-21 (内容量2.0g) | A-1 | 食前又は食間 2~3回 | <KB-21> 3.0g×28包 [分包] 3.0g×168包 [分包] <EK-21> 2.0g×42包 [分包] 2.0g×294包 [分包] 500g [ボトル] | 6.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | 2023年7月改訂 (第1版) | コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 小太郎漢方製薬 | 16100AMZ04739000 1987年10月 | 6.0 | 1.2 | ステアリン酸マグネシウム、トウモロ コシデンブ、乳糖水和物、プルラ ン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム | 細粒 | N21 | B | 食前又は食間 2~3回 | 500g [ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包 [分包] 2.0g×231包 [分包] | 5.0 | 1.3 | 5.0 |
| 4 | 2023年12月改訂 (第1版) | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) ツムラ | 16100AMZ01123000 1986年10月 | 7.5 | 2.25 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局 乳糖水和物 | 顆粒 | ツムラ/21 | C | 食前又は食間 2~3回 | 500g [ボトル] 2.5g×42包 [分包] 2.5g×189包 [分包] | 6.0 | 1.5 | 5.0 |
| 5 | 2023年9月改訂 (第1版) | 本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒-M 本草製薬 | 16200AMZ00545000 1987年10月 | 7.5 | 1.4 | 乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マ グネシウム、ステアリン酸マグネシウ ム | 顆粒 | H21 | A-1 | 食前又は食間 3回 | 500g (バラ包装) [ボトル] 735g (2.5g×294包) [分包] 105g (2.5g×42包) [分包] | 6.0 | 1.5 | 5.0 |

【効能又は効果一覧】

| | |
|-----|--|
| A-1 | つわり、嘔吐、悪心 |
| A-2 | つわり、悪心、嘔吐 |
| B | 胃部に水分停滞感があって、嘔吐するもの。 つわり、嘔吐症。 |
| C | 体力中等度の次の諸症： 妊娠嘔吐（つわり）、そのほかの諸病の嘔吐（急性胃腸炎、湿性胸 膜炎、水腫性脚気、蓄膿症） |