

104 猪苓湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準記載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
												チヨレイ	ブクリヨウ	カッセキ	タクシャ	アキヨウ	ゼラチン
1	2005年10月作成	オースギ猪苓湯エキスG 大杉製薬	(62AM)第0325号 1987年10月 1987年10月	6.0	0.4*	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-40	A	食前又は食間 2~3回	500g 588g(2.0g×294包) 168g(2.0g×84包)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
2	2012年1月改訂 (第3版、日局収載 に伴う改訂)	クラシエ猪苓湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)4214 2007年7月 2007年7月	6.0	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-40 3.0g EK-40 2.0g	A	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
3	2012年6月改訂 (第6版)	コタロー猪苓湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)4662 1987年10月 1987年10月	6.0	1.2*	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N40	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0
4	2014年2月改訂 (第4版)	三和猪苓湯エキス細粒 三和生薬	61AM第3631 1986年10月 1986年11月	7.5	3.7	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	細粒	S-34	C	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0
5	2016年9月改訂 (第5版)	JPS猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4660 1987年10月 1987年10月	7.5	5.2	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-40)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
6	2011年6月改訂 (第4版)	太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(62AM)0178 1987年10月 1987年10月	6.0	4.2	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-40	A	食前又は食間 3回	500g 2.0g×84包 2.0g×315包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
7	2013年3月改訂 (第5版)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3282 1986年10月 1986年10月	7.5	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/40	D	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
8	2017年8月改訂 (第7版)	テイコク猪苓湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(62AM)0068 1987年10月 1987年10月	7.5	2.49	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 40 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
9	2005年10月改訂 第4版	〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 東洋薬行	(62AMY)0395 1988年7月 1988年10月	6.0	4.0	トウモロコシデンプン	細粒	TY-080	A	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
10	2011年7月改訂 (第4版)	本草猪苓湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4818号 1987年10月 1987年10月	7.5	2.4	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H40	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
11	2016年4月改訂 (第3版)	マツウラ猪苓湯エキス顆粒 松浦薬業	(63AM)第406号 1988年7月 1988年7月	6.0	0.7*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、デキストリン、乳糖水和物	顆粒	40, マツウラ (分包品)	A	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0

* : アキヨウ又はゼラチンを含まないエキス量

【効能又は効果一覧】

A	尿量が減少し、尿が出にくく、排尿痛あるいは残尿感のあるもの
B	咽喉がかわき、排尿痛あるいは排尿困難があり、尿の色は赤いか、または血液の混じるもの、あるいは腰や下肢に浮腫があるもの。 腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル、尿道炎、腎臓・膀胱結石による排尿困難。
C	膀胱炎、特に急性膀胱炎、腎炎、腎臓結石症又は尿道炎における口渴、尿意頻数、排尿痛の諸症に用いる
D	尿量減少、小便難、口渴を訴えるものの次の諸症： 尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢