

107 桃核承気湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準記載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
												トウニン	ケイヒ	ダイオウ	ボウシヨウ	無水ボウシヨウ	硫酸ナトリウム	カンゾウ
1	2005年10月作成	オースギ桃核承気湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第4810号 1987年10月 1987年10月	4.5	2.4	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-61	A-2	食前又は食間 2~3回	500g 441g(1.5g×294包) 126g(1.5g×84包)	5.0	4.0	3.0	0.9	0.9	1.5	
2	2017年5月改訂 (第3版)	クラシエ桃核承気湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3521 2007年7月 2007年7月	6.0	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局軽質無水ケイ酸、日局白糖、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-61 3.0g EK-61 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	5.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.5	
3	2017年5月改訂 (第3版)	クラシエ桃核承気湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00635000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	2.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-61)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包 ×14シート) 1,764錠(3錠×6連包 ×98シート)	5.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.5	
4	2016年10月改訂 (第6版)	コタロー桃核承気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3829 1986年10月 1986年10月	6.0	3.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N61	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	5.0	4.0	3.0	0.9	0.9	1.5	
5	2016年4月改訂 (第5版)	JPS桃核承気湯エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	62AM-0477 1987年10月 1987年10月	7.5	2.4	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-61)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.5	
6	2017年6月改訂 (第3版)	ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00419000 1986年10月 1986年10月	6.0	2.3	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 61	A-1	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)	5.0	4.0	3.0	0.9	0.9	1.5	
7	2007年5月改訂 (第4版)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3281 1986年10月 1986年10月	7.5	3.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/61	A-1	食前 3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	4.0	3.0	0.9	0.9	1.5	
8	2017年8月改訂 (第7版)	テイコク桃核承気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3655 1987年10月 1987年10月	7.5	2.38	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 61 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.5	
9	2017年4月改訂 (第4版)	本草 桃核承気湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4142号 1986年10月 1986年10月	7.5	2.3	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H61	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.5	

【効能又は効果一覧】

A-1	比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症： 月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）
A-2	比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症： 月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、肩こり、めまい）
B	頭痛またはのぼせる傾向があり、左下腹部に圧痛や宿便を認め、下肢や腰が冷えて尿量減少するもの。 常習便秘、高血圧、動脈硬化、腰痛、痔核、月経不順による諸種の障害、更年期障害、にきび、しみ、湿疹、こしけ、坐骨神経痛。