

107 桃核承気湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
											トウ ニン	ケ イ ヒ	ダ イ オ ウ	ポ ウ シ ヨ ウ	無 水 ポ ウ シ ヨ ウ	十 硫 酸 ナ ト リ ウ ム
1 2022年2月改訂 (第1版)	オースギ桃核承気湯エキスG 大杉製薬	16100AMZ04810000 - 1987年10月	4.5	2.4	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-61	A-2	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 441g(1.5g×294包) 126g(1.5g×84包)	5.0	4.0	3.0	0.9	1.5	
2 2017年5月改訂 (第3版)	クラシエ桃核承気湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3521 2007年7月 2007年7月	6.0	2.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局軽質無水ケイ酸、日局白糖、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-61 3.0g EK-61 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	5.0	4.0	3.0	1.0	1.5	
3 2017年5月改訂 (第3版)	クラシエ桃核承気湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00635000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	2.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-61)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包 ×14シート) 1,764錠(3錠×6連包 ×98シート)	5.0	4.0	3.0	1.0	1.5	
4 2016年10月改訂 (第6版)	コタロー桃核承気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3829 1986年10月 1986年10月	6.0	3.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N61	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	5.0	4.0	3.0	0.9	1.5	
5 2016年4月改訂 (第5版)	JPS桃核承気湯エキス顆粒【調剤用】 ジェーピーエス製薬	62AM-0477 1987年10月 1987年10月	7.5	2.4	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-61)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	
6 2022年2月改訂 (第1版)	ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00419000 - 1986年10月	6.0	2.3	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 61	A-1	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包) [分包]	5.0	4.0	3.0	0.9	1.5	
7 2007年5月改訂 (第4版)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3281 1986年10月 1986年10月	7.5	3.0	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/61	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	4.0	3.0	0.9	1.5	
8 2017年8月改訂 (第7版)	テイコク桃核承気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3655 1987年10月 1987年10月	7.5	2.38	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 61 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	
9 2017年4月改訂 (第4版)	本草 桃核承気湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4142号 1986年10月 1986年10月	7.5	2.3	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H61	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	

【効能又は効果一覧】

A-1	比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症： 月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）
A-2	比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症： 月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、肩こり、めまい）
B	頭痛またはのぼせる傾向があり、左下腹部に圧痛や宿便を認め、下肢や腰が冷えて尿量減少するもの。 常習便秘、高血圧、動脈硬化、腰痛、痔核、月経不順による諸種の障害、更年期障害、にきび、しみ、湿疹、こしけ、坐骨神経痛。