

123 半夏瀉心湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
											ハンゲ	オウゴン	カンキョウ	ショウキョウ	ニンジン	カンゾウ	タイソウ
1 2017年1月改訂 (第2版)	オースギ半夏瀉心湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3889号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.4	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-14	A-2	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
2 2017年1月改訂 (第4版)	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00639000 2007年7月 2007年7月	6.0	3.8	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-14 3.0g EK-14 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
3 2013年10月改訂 (第3版、日局収載 に伴う改訂)	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00645000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	3.8	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、日局クロスカルメルロースナトリウム	錠剤	(EKT-14)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート) 1,764錠(3錠×6連包×98シート)	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
4 2017年1月改訂 (第7版)	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3834 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N14	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×189包(472.5g) 2.5g×42包(105g)	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
5 2018年3月改訂 (第6版)	三和半夏瀉心湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3598 1986年10月 1986年11月	7.5	4.9	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-18	C	食前又は食間 3回	500g 2.5g×300包	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
6 2017年1月改訂 (第7版)	JPS半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4767 1987年10月 1987年10月	7.5	4.6	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-14)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
7 2017年1月改訂 (第4版)	ジュンコウ半夏瀉心湯FGエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00422000 1986年10月 1986年10月	6.0	3.2	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 14	A-3	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
8 2017年1月改訂 (第6版)	太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3911 1986年10月 1986年11月	6.0	3.12	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-14	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.0g×84包 2.0g×315包	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
9 2017年1月改訂 (第9版)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3257 1986年10月 1986年10月	7.5	4.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/14	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
10 2017年8月改訂 (第9版)	テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3697 1987年10月 1987年10月	9.0	4.31	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 14 (分包品に表示)	A-4	食前 3回	500g 3.0g×42包 3.0g×252包	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
11 2017年1月改訂 第6版	【東洋】半夏瀉心湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0403 1986年10月 1986年12月	6.0	3.6	トウモロコシデンブ	細粒	TY-094	A-1	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
12 2017年1月改訂 (第6版)	本草半夏瀉心湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4144号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.4	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H14	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
13 2017年1月改訂 (第6版)	マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4221号 1986年10月 1986年10月	6.0	軟エキス 7.3*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	14、マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0

\* : 乾燥エキス2.9g相当

【効能又は効果一覧】

A-1	みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症： 急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
A-2	みぞおちがつかえ、ときに悪心・嘔吐があり、食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症： 急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
A-3	みぞおちがつかえ、ときに悪心・嘔吐があり、食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症： 急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
A-4	みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり、食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症： 急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
B	胃部がつかえ、悪心や嘔吐があり、食欲不振で舌苔や胃部に水分停滞感があり、腹鳴をともなって下痢するもの、あるいは軟便や粘液便を排出するもの。 急性・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、口内炎、つわり。
C	胃部がつかえて悪心や嘔吐があり、舌苔や胃部に水分停滞感があって、食欲不振で、腹鳴を伴って、下痢又は軟便を排出するもの次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、口内炎、消化不良、胃下垂、胃アトニー症、胃及び十二指腸潰瘍の軽症又は予後、つわり