

123 半夏瀉心湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
												ハンゲ	オウゴン	カンキョウ	ショウキョウ	ニンジン	カンゾウ	タイソウ
1	2022年2月改訂 (第1版)	オースギ半夏瀉心湯エキスG 大杉製薬	16100AMZ03889000 1986年10月	7.5	3.4	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-14	A-2	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 210g(2.5g×84包)[分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
2	2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00639000 1986年10月	6.0	3.8	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-14 (内容量3.0g) EK-14 (内容量2.0g)	A-1	食前又は食間 2~3回	(KB-14) 3.0g×28包[分包] 3.0g×168包[分包] (EK-14) 2.0g×42包[分包] 2.0g×294包[分包] 500g[ボトル]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
3	2023年10月改訂 (第1版)	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00645000 1986年10月	5.94 (18錠)	3.8	日局ラウリル硫酸ナトリウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、日局結晶セルロース、日局クロスカルメロースナトリウム	錠剤	EKT-14	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート) [分包] 1,764錠(3錠×6連包×98シート) [分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
4	2023年1月改訂 (第1版)	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	16100AMZ03834000 1986年10月	7.5	5.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N14	B	食前又は食間 2~3回	500g[ポリ瓶、バラ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
5	2022年4月改訂 (第1版)	三和半夏瀉心湯エキス細粒 三和生薬	16100AMZ03598000 1986年11月	7.5	4.9	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファ化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-18	C	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 2.5g×300包[分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
6	2023年12月改訂 (第1版)	JPS半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	16100AMZ04767000 1987年10月	7.5	4.6	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	J-14	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
7	2022年2月改訂 (第1版)	ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00422000 1986年10月	6.0	3.2	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 14	A-1	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)[分包]	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
8	2024年2月改訂 (第1版)	太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	16100AMZ03911000 1986年11月	6.0	3.12	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	Tai TM-14	A-1	食前又は食間 3回	500g[ボトル] 2.0g×84包[分包] 2.0g×315包[分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
9	2023年12月改訂 (第1版)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	16100AMZ03257000 1986年10月	7.5	4.5	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物、ショ糖脂肪酸エステル	顆粒	ツムラ/14	A-1	食前又は食間 2~3回	500g[ボトル] 5kg(500g×10)[パウチ] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
10	2023年11月改訂 (第1版)	〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 東洋薬行	16100AMY00403000 1986年12月	6.0	3.6	トウモロコシデンブ(賦形剤)	細粒	TY-094	A-1	空腹時 3回	500g[ボトル] 2.0g×252包[分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0
11	2023年9月改訂 (第1版)	本草半夏瀉心湯エキス顆粒-M 本草製薬	16100AMZ04144000 1986年10月	7.5	3.4	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H14	A-1	食前又は食間 3回	500g(バラ包装)[ボトル] 735g(2.5g×294包)[分包] 105g(2.5g×42包)[分包]	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0

【効能又は効果一覧】

A-1	みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症： 急・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
A-2	みぞおちがつかえ、ときに悪心・嘔吐があり、食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症： 急・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
A-3	みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり、食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症： 急・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
B	胃部がつかえ、悪心や嘔吐があり、食欲不振で舌苔や胃部に水分停滞感があり、腹鳴をともなって下痢するもの、あるいは軟便や粘液便を排出するもの。 急性・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、消化不良、口内炎、つわり。
C	胃部がつかえて悪心や嘔吐があり、舌苔や胃部に水分停滞感があって、食欲不振で、腹鳴を伴って、下痢又は軟便を排