

126 茯苓飲

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
												ブクリヨウ	ビヤクジュツ	ソウジュツ	ニンジン	シヨウキョウ	テンピ	キジツ
1	2008年2月改訂 (第5版)	コタロー茯苓飲エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3837 1986年10月 1986年10月	6.0	3.8	ステアリン酸マグネシウム、 トウモロコシデンプン、乳糖 水和物、プルラン、メタケイ 酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N69	A	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	5.0	4.0	/	3.0	0.8	3.0	1.5
2	2013年3月改訂 (第5版)	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1130 1986年10月 1986年10月	7.5	2.75	日局ステアリン酸マグネシウ ム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/69	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	/	4.0	3.0	1.0	3.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A	胃部がつかえて膨満感があり、胃液の分泌が過多で悪心、嘔吐や食欲不振があつて尿量減少するもの。 胃炎、胃下垂、胃アトニー、胃神経症、胃拡張、溜飲症、消化不良。
B	吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症： 胃炎、胃アトニー、溜飲