

126 茯苓飲

| | 添付文書の作成 又は改訂年月 | 商品名 製造販売元 発売元又は販売元 | 承認番号 販売開始年月 | 一日 製剤量 (g) | 一日 エキス量 (g) | 添加物 | 剤形 | 識別コード (商品番号等) | 効能又は 効果 | 用法及び用量 | 包装 | 生薬組成 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---|----|------------------|------------|----------------|---|-------|--------|-------|------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | ブクリヨウ | ビヤクジュツ | ソウジュツ | ニンジン | ショウキョウ | チンピ | キジツ |
| 1 | 2023年7月改訂 (第1版) | コタロー茯苓飲エキス細粒 小太郎漢方製薬 | 16100AMZ03837000 1986年10月 | 6.0 | 3.8 | ステアリン酸マグネシウム、 トウモロコシデンプン、乳糖 水和物、プルラン、メタケイ 酸アルミン酸マグネシウム | 細粒 | N69 | A | 食前又は食間 2~3回 | 500g[ポリ瓶、バラ] 2.0g×42包[分包] 2.0g×231包[分包] | 5.0 | 4.0 | / | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.5 |
| 2 | 2023年12月改訂 (第1版) | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) ツムラ | 16100AMZ01130000 1986年10月 | 7.5 | 2.75 | 日局ステアリン酸マグネシウ ム、日局乳糖水和物 | 顆粒 | ツムラ/69 | B | 食前又は食間 2~3回 | 500g[ボトル] 2.5g×42包[分包] 2.5g×189包[分包] | 5.0 | / | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |

【効能又は効果一覧】

| | |
|---|---|
| A | 胃部がつかえて膨満感があり、胃液の分泌が過多で悪心、嘔吐や食欲不振があつて尿量減少するもの。 胃炎、胃下垂、胃アトニー、胃神経症、胃拡張、溜飲症、消化不良。 |
| B | 吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症： 胃炎、胃アトニー、溜飲 |