

128 附子理中湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
												ニンジン	加 エ ブ シ	ブ シ	カ ン キ ョ ウ	カ ン ゾ ウ	ビ ヤ ク ジ ュ ツ
1	2016年6月改訂 (第4版)	三和附子理中湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3614 1986年10月 1986年11月	4.5	2.8	乳糖水和物、トウモロコシデン ブ、結晶セルロース、部分ア ルファー化デンプン、軽質無水 ケイ酸	細粒	S-09	A	食前又は食間 3回	500g 1.5g×300包	3.0	1.0	/	3.0	3.0	3.0
2	2010年7月改訂 (第5版)	三和附子理中湯エキス細粒 三和生薬 クラシエ薬品	(61AM)3614 1986年10月 1986年11月	4.5	2.8	日局乳糖水和物、日局トウモロ コシデンブ、日局結晶セル ロース、日局軽質無水ケイ酸、 部分アルファー化デンプン	細粒	(EK-410)	A	食前又は食間 3回	500g 1.5g×42包 1.5g×294包	3.0	/	1.0	3.0	3.0	3.0

【効能又は効果一覧】

A	胃腸虚弱で血色悪く、顔に生氣なく、尿量多く手足に冷感あり、下痢の傾向あり、しばしばはき気、目眩、頭重、胃痛をうたえるものの次の諸症 慢性の胃腸カタル、胃アトニー症
---	--