

130 防己黄耆湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
											ボウイ	オウギ	ビヤクジュツ	ソウジュツ	シヨウキョウ	タイソウ
1	2005年10月作成 オースギ防己黄耆湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3872号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-20	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 735g (2.5g×294包) 210g (2.5g×84包)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
2	2017年5月改訂 (第3版) クラシエ防己黄耆湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00625000 2007年7月 2007年7月	7.5	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-20 3.75g EK-20 2.5g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.75g×28包 3.75g×168包 2.5g×42包 2.5g×294包 500g	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
3	2017年5月改訂 (第3版) クラシエ防己黄耆湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00614000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局軽質無水ケイ酸、日局カルメロースカルシウム、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-20)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠 (3錠×6連包×14シート) 1,764錠 (3錠×6連包×98シート)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
4	2007年11月改訂 (第6版) コタロー防己黄耆湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3959 1986年10月 1986年10月	7.5	4.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N20	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×189包 (472.5g) 2.5g×42包 (105g)	5.0	5.0	3.0	0.8	3.0	1.5
5	2016年4月改訂 (第4版) JPS防己黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	62AM-0479 1987年10月 1987年10月	7.5	2.8	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-20)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g (2.5g×300包) 105g (2.5g×42包)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
6	2016年11月改訂 (第5版) ジュンコウ防己黄耆湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00376000 1986年10月 1986年10月	6.0	3.55	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 20	A-2	食前又は食間 2~3回	168g (2.0g×84包)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
7	2011年5月改訂 (第5版) 太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)4824 1987年10月 1987年10月	7.5	4.51	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-20	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
8	2007年5月改訂 (第5版) ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3279 1986年10月 1986年10月	7.5	3.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/20	C	食前又は食間 2~3回	500g 5kg (500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
9	2017年8月改訂 (第7版) テイコク防己黄耆湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3703 1987年10月 1987年10月	7.5	3.02	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 20 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
10	2007年6月改訂 (第4版) 本草 防己黄耆湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4145号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.2	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H20	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5
11	2016年4月改訂 (第4版) マツウラ防己黄耆湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4047号 1986年10月 1986年10月	6.0	軟エキス 6.2*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	20、マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5

* : 乾燥エキス3.1g相当

【効能又は効果一覧】

A-1	色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
A-2	色白で疲れやすく、汗をかきやすい傾向のあるものの次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
B	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすくて、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。 関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。
C	色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、 膝関節の腫痛するものの次の諸症： 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰嚢水腫、肥満症、関節炎、癰、瘡、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順