

130 防已黄耆湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成						
											ボ ウ イ	オ ウ ギ	ビ ヤ ク ジ ユ ツ	ソ ウ ジ ユ ツ	シ ョ ウ ウ キ ヨ ウ	タ イ ソ ウ	カ ン ゾ ウ
1	2005年10月作成 オースギ防已黄耆湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3872号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.8	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-20	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 735g(2.5g×294包) 210g(2.5g×84包)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
2	2017年5月改訂 (第3版) クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00625000 2007年7月 2007年7月	7.5	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-20 3.75g EK-20 2.5g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.75g×28包 3.75g×168包 2.5g×42包 2.5g×294包 500g	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
3	2017年5月改訂 (第3版) クラシエ防已黄耆湯エキス錠 大峰堂薬品工業 クラシエ薬品	21900AMX00614000 2007年7月 2007年7月	5.94 (18錠)	3.2	日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局軽質無水ケイ酸、日局カルメロースカルシウム、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウム	錠剤	(EKT-20)	A-1	食前又は食間 2~3回	252錠(3錠×6連包×14シート) 1,764錠(3錠×6連包×98シート)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
4	2007年11月改訂 (第6版) コタロー防已黄耆湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3959 1986年10月 1986年10月	7.5	4.8	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N20	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×189包(472.5g) 2.5g×42包(105g)	5.0	5.0	3.0	0.8	3.0	1.5	
5	2016年4月改訂 (第4版) JPS防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	62AM-0479 1987年10月 1987年10月	7.5	2.8	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-20)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
6	2016年11月改訂 (第5版) ジュンコウ防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00376000 1986年10月 1986年10月	6.0	3.55	トウモロコシデンプン、乳糖水和物	細粒	FC 20	A-2	食前又は食間 2~3回	168g(2.0g×84包)	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
7	2011年5月改訂 (第5版) 太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)4824 1987年10月 1987年10月	7.5	4.51	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-20	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
8	2007年5月改訂 (第5版) ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3279 1986年10月 1986年10月	7.5	3.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/20	C	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
9	2017年8月改訂 (第7版) テイコク防已黄耆湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3703 1987年10月 1987年10月	7.5	3.02	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 20 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
10	2007年6月改訂 (第4版) 本草 防已黄耆湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4145号 1986年10月 1986年10月	7.5	3.2	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H20	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	
11	2016年4月改訂 (第4版) マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4047号 1986年10月 1986年10月	6.0	軟エキス 6.2*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンプン	顆粒	20, マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2g×84包 2g×300包	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.5	

\* : 乾燥エキス3.1g相当

【効能又は効果一覧】

A-1	色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
A-2	色白で疲れやすく、汗をかきやすい傾向のあるものの次の諸症： 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
B	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすくて、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。 関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。
C	色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、 膝関節の腫痛するものの次の諸症： 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰嚢水腫、肥満症、関節炎、癰、瘡、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順