

132 補中益気湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成												
											ニンジン	ビャクジュツ	ソウジュツ	オウギ	トウキ	チンピ	タイソウ	サイコ	カンゾウ	ショウキョウ	生ショウキョウ	カンキョウ	ショウマ
1	2005年10月作成 オースギ補中益気湯エキスG 大杉製薬	(61AM)第3898号 1986年10月 1986年10月	12.0	6.2	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-41	A	食前又は食間 2~3回	500g 1.176g(4.0g×294包) 336g(4.0g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
2	2010年7月改訂 (第2版) クラシエ補中益気湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3511 2007年7月 2007年7月	7.5	6.4	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-41 3.75g EK-41 2.5g	A	食前又は食間 2~3回	3.75g×28包 3.75g×168包 2.5g×42包 2.5g×294包 500g	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
3	2007年11月改訂 (第6版) コタロー補中益気湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3949 1986年10月 1986年10月	12.0	7.0	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N41	B	食前又は食間 2~3回	500g 4.0g×147包(588g) 4.0g×42包(168g)	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
4	2015年8月改訂 (第5版) 三和補中益気湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3616 1986年10月 1986年11月	9.0	5.3	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-12	C	食前又は食間 3回	500g 3g×300包	4.0	4.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
5	2007年6月改訂 (第5版) JPS補中益気湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	62AM-0480 1987年10月 1987年10月	7.5	4.7	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-41)	A	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	4.0	/	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.5	0.5	/	/	0.5
6	2016年11月改訂 (第4版) ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00380000 1986年10月 1986年10月	7.5	4.9	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 41	A	食前又は食間 2~3回	210g(2.5g×84包)	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
7	2016年10月改訂 (第2版) ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠 医療用 康和薬通 大杉製薬	16200AMY00036000 2014年12月 2015年3月	7.5 (18錠)	4.9	トウモロコシデンブ、乳糖水和物、タルク、ステアリン酸マグネシウム	錠剤	FC 41T	A	食前又は食間 2~3回	504錠(3錠×168包)	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
8	2010年10月改訂 (第6版) 太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3913 1986年10月 1986年11月	7.5	5.55	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-41	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
9	2011年3月改訂 (第5版) 太虎堂の補中益気湯エキス散 太虎精堂製薬	(61AM)3860 1986年10月 1986年11月	7.5	5.55	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	散剤	TM-41P	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×84包 2.5g×252包	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
10	2014年10月改訂 (第11版) ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1164 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/41	D	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	4.0	/	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	0.5	/	/	1.0
11	2017年8月改訂 (第8版) テイコク補中益気湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3701 1987年10月 1987年10月	7.5	3.57	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 41 (分包品に表示)	A	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.5	0.5	/	/	0.5
12	2005年7月改訂 第6版 〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0477 1987年10月 1988年1月	7.5	4.8	トウモロコシデンブ	細粒	TY-101	A	空腹時 3回	500g 2.5g×252包	4.0	4.0	/	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	/	2.0	/	1.0
13	2007年6月改訂 (第5版) 本草 補中益気湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4143号 1986年10月 1986年10月	7.5	5.0	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H41	A	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	4.0	4.0	/	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.5	/	/	0.5	0.5

【効能又は効果一覧】

A	元気がなく胃腸のはたらきが衰えて疲れやすいものの次の諸症： 虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ
B	胃腸機能減退し、疲労倦怠感があるもの、あるいは頭痛、悪寒、盗汗、弛緩性出血などを伴うもの。 結核性疾患および病後の体力増強、胃弱、貧血症、夏やせ、虚弱体質、低血圧、腺病質、痔疾、脱肛。
C	体力が乏しく貧血ぎみで、胃腸機能が減退し、疲労倦怠感や食欲不振あるいは盗汗などあるものの次の諸症 病後・術後の衰弱、胸部疾患の体力増強、貧血症、低血圧症、夏やせ、胃弱、胃腸機能減退、多汗症
D	消化機能が衰え、四肢倦怠感著しい虚弱体質者の次の諸症： 夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症