

133 麻黄湯

	添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成			
												マ オ ウ	ケ イ ヒ	キ ョ ウ ウ ニ ン	カ ン ゾ ウ
1	2015年3月改訂 (第4版)	クラシエ麻黄湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)1153 2007年7月 2007年7月	6.0	1.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-27 3.0g EK-27 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	5.0	4.0	5.0	1.5
2	2010年10月改訂 (第7版)	コタロー麻黄湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3961 1986年10月 1986年10月	6.0	1.9	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N27	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	5.0	4.0	5.0	1.5
3	2017年4月改訂 (第4版)	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00377000 1986年10月 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 27	A-2	食前又は食間 2~3回	126g(1.5g×84包)	5.0	4.0	5.0	1.5
4	2013年3月改訂 (第8版)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)3274 1986年10月 1986年10月	7.5	1.75	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/27	C	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×42包 2.5g×189包	5.0	4.0	5.0	1.5
5	2017年8月改訂 (第7版)	テイコク麻黄湯エキス顆粒 帝國漢方製薬 帝國製薬	(61AM)3702 1988年7月 1988年7月	7.5	1.81	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TEIKOKU 27 (分包品に表示)	A-1	食前 3回	500g 2.5g×42包 2.5g×252包	5.0	4.0	5.0	1.5
6	2010年10月改訂 (第5版)	本草 麻黄湯エキス顆粒-S 本草製薬	(62AM)第0485号 1988年4月 1988年3月	7.5	1.92	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H27	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	5.0	4.0	5.0	1.5

【効能又は効果一覧】

A-1	風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体の不ふしが痛い場合の次の諸症： 感冒、鼻かぜ
A-2	風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体の不ふしが痛いものの次の諸症： 感冒、鼻かぜ
B	高熱悪寒があるにもかかわらず、自然の発汗がなく、身体痛、関節痛のあるもの、あるいは咳嗽や喘鳴のあるもの。 感冒、鼻かぜ、乳児鼻づまり、気管支喘息。
C	悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症： 感冒、インフルエンザ（初期のもの）、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難