

147 苓桂朮甘湯

添付文書の作成 又は改訂年月	商品名 製造販売元 発売元又は販売元	承認番号 薬価基準収載年月 販売開始年月	一日 製剤量 (g)	一日 エキス量 (g)	添加物	剤形	識別コード (商品番号等)	効能又は 効果	用法及び用量	包装	生薬組成					
											ブクリヨウ	ビヤクジュツ	ソウジュツ	ケイヒ	ケイシ	カンソウ
1	2019年1月作成 オースギ苓桂朮甘湯エキスTG 大杉製薬	(61AM)第4188号 1986年10月 1986年10月	4.5	1.6	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	SG-39	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 441g(1.5g×294包) 126g(1.5g×84包)	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0
2	2010年7月改訂 (第2版) クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 クラシエ製薬 クラシエ薬品	(61AM)3576 2007年7月 2007年7月	6.0	1.6	日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素	細粒	KB-39 3.0g EK-39 2.0g	A-1	食前又は食間 2~3回	3.0g×28包 3.0g×168包 2.0g×42包 2.0g×294包 500g	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0
3	2008年3月改訂 (第5版) コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 小太郎漢方製薬	(61AM)3843 1986年10月 1986年10月	6.0	1.7	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	細粒	N39	B	食前又は食間 2~3回	500g 2.0g×231包(462g) 2.0g×42包(84g)	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0
4	2018年10月改訂 (第3版) 三和苓桂朮甘湯エキス細粒 三和生薬	(61AM)3621 1986年10月 1986年11月	4.5	1.7	乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸	細粒	S-16	C	食前又は食間 3回	500g 1.5g×300包	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0
5	2007年8月改訂 (第4版) JPS 苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 ジェーピーエス製薬	61AM-4769 1987年10月 1987年10月	7.5	1.8	ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	顆粒	(J-39)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)	6.0	/	3.0	4.0	/	2.0
6	2017年2月改訂 (第3版) ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス細粒 医療用 康和薬通 大杉製薬	16100AMY00361000 1986年10月 1986年10月	4.5	2.25	トウモロコシデンブ、乳糖水和物	細粒	FC 39	A-2	食前又は食間 2~3回	126g(1.5g×84包)	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0
7	2010年10月改訂 (第4版) 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 太虎精堂製薬	(61AM)3909 1986年10月 1986年11月	6.0	2.56	日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム	顆粒	TM-39	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.0g×84包 2.0g×315包	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0
8	2007年5月改訂 (第4版) ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) ツムラ	(61AM)1121 1986年10月 1986年10月	7.5	1.5	日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物	顆粒	ツムラ/39	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 5kg(500g×10) 2.5g×42包 2.5g×189包	6.0	/	3.0	4.0	/	2.0
9	2014年1月改訂 第5版 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 東洋薬行	(61AMY)0393 1986年10月 1986年12月	6.0	3.0	トウモロコシデンブ	細粒	TY-110	A-1	空腹時 3回	500g 2.0g×252包	6.0	3.0	/	/	4.0	2.0
10	2009年6月改訂 (第4版) 本草 苓桂朮甘湯エキス顆粒-M 本草製薬	(61AM)第4137号 1986年10月 1986年10月	7.5	1.6	乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム	顆粒	H39	A-1	食前又は食間 3回	500g 2.5g×294包 2.5g×42包	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0
11	2016年4月改訂 (第3版) マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 松浦薬業	(61AM)第4335号 1987年10月 1987年10月	4.5	軟エキス 4.0*	ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、デキストリン、トウモロコシデンブ	顆粒	39. マツウラ (分包品)	A-1	食前又は食間 2~3回	500g 1.5g×84包 1.5g×300包	6.0	3.0	/	4.0	/	2.0

* : 乾燥エキス2.0g相当

【効能又は効果一覧】

A-1	めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症： 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛
A-2	めまい、ふらつきまたは動悸があり、尿量が減少するものの次の諸症： 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛
B	立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。 神経性心臓亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。
C	頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心臓亢進などがあって不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるものの次の諸症 神経性心臓亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患