

147 苓桂朮甘湯

| 添付文書の作成<br>又は改訂年月         | 商品名<br>製造販売元<br>発売元又は販売元              | 承認番号<br>販売開始年月               | 一日<br>製剤量<br>(g) | 一日<br>エキス量<br>(g) | 添加物  | 剤形 | 識別コード<br>(商品番号等)                         | 効能又は<br>効果 | 用法及び用量         | 包装   | 生薬組成  |        |       |     |     |      |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--|----|--|------------|----------------|--|-------|--------|-------|-----|-----|------|
|                           |                                       |                              |                  |                   |  |    |  |            |                |  | ブクリヨウ | ビヤクジュツ | ソウジュツ | ケイヒ | ケイシ | カンゾウ |
| 1<br>2022年10月改訂<br>(第1版)  | オースギ苓桂朮甘湯エキスTG<br>大杉製薬                | 16100AMZ04188000<br>1986年10月 | 4.5              | 1.6               | 乳糖水和物、トウモロコシデンブ、ステアリン酸マグネシウム                       | 顆粒 | SG-39                                    | A-1        | 食前又は食間<br>2~3回 | 500g [ボトル]<br>441g (1.5g×294包)<br>[分包]<br>126g (1.5g×84包)<br>[分包]                                      | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 2<br>2023年10月改訂<br>(第1版)  | クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒<br>クラシエ<br>クラシエ薬品      | 16100AMZ03576000<br>1986年10月 | 6.0              | 1.6               | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素          | 細粒 | KB-39<br>(内容量3.0g)<br>EK-39<br>(内容量2.0g) | A-1        | 食前又は食間<br>2~3回 | (KB-39)<br>3.0g×28包 [分包]<br>3.0g×168包 [分包]<br>(EK-39)<br>2.0g×42包 [分包]<br>2.0g×294包 [分包]<br>500g [ボトル] | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 3<br>2023年7月改訂<br>(第1版)   | コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒<br>小太郎漢方製薬             | 16100AMZ03843000<br>1986年10月 | 6.0              | 1.7               | ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | 細粒 | N39                                      | B          | 食前又は食間<br>2~3回 | 500g [ポリ瓶、バラ]<br>2.0g×42包 [分包]<br>2.0g×231包 [分包]   | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 4<br>2022年9月改訂<br>(第1版)   | 三和苓桂朮甘湯エキス細粒<br>三和生薬                  | 16100AMZ03621000<br>1986年11月 | 4.5              | 1.7               | 乳糖水和物、トウモロコシデンブ、結晶セルロース、部分アルファー化デンブ、軽質無水ケイ酸        | 細粒 | S-16                                     | C          | 食前又は食間<br>3回   | 500g [ボトル]<br>1.5g×300包 [分包]   | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 5<br>2023年12月改訂<br>(第1版)  | JPS苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕<br>ジェーピーエス製薬       | 16100AMZ04769000<br>1987年10月 | 7.5              | 1.8               | ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物                          | 顆粒 | J-39                                     | A-1        | 食前又は食間<br>2~3回 | 500g<br>750g (2.5g×300包)<br>105g (2.5g×42包)  | 6.0   | /      | 3.0   | 4.0 | /   | 2.0  |
| 6<br>2022年10月改訂<br>(第1版)  | ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス細粒 医療用<br>康和薬通<br>大杉製薬 | 16100AMY00361000<br>1986年10月 | 4.5              | 2.25              | トウモロコシデンブ、乳糖水和物                                    | 細粒 | FC39                                     | A-2        | 食前又は食間<br>2~3回 | 126g (1.5g×84包)<br>[分包]  | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 7<br>2022年10月改訂<br>(第1版)  | ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス錠 医療用<br>康和薬通<br>大杉製薬  | 16200AMY00018000<br>2020年6月  | 4.5<br>(15錠)     | 2.25              | トウモロコシデンブ、乳糖水和物、タルク、ステアリン酸マグネシウム                   | 錠剤 | FC39T                                    | A-2        | 食前又は食間<br>2~3回 | 420錠 (5錠×84包)<br>[分包]  | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 8<br>2024年2月改訂<br>(第1版)   | 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒<br>太虎精堂製薬              | 16100AMZ03909000<br>1986年11月 | 6.0              | 2.56              | 日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウム                             | 顆粒 | Tai TM-39                                | A-1        | 食前又は食間<br>3回   | 500g [ボトル]<br>2.0g×84包 [分包]<br>2.0g×315包 [分包]  | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 9<br>2023年12月改訂<br>(第1版)  | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)<br>ツムラ             | 16100AMZ01121000<br>1986年10月 | 7.5              | 1.5               | 日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物                   | 顆粒 | ツムラ/39                                   | A-1        | 食前又は食間<br>2~3回 | 500g [ボトル]<br>5kg (500g×10)<br>[パウチ]<br>2.5g×42包 [分包]<br>2.5g×189包 [分包]                                | 6.0   | /      | 3.0   | 4.0 | /   | 2.0  |
| 10<br>2023年10月改訂<br>(第1版) | 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒<br>東洋薬行                | 16100AMY00393000<br>1986年12月 | 6.0              | 3.0               | トウモロコシデンブ<br>(賦形剤)                                 | 細粒 | TY-110                                   | A-1        | 空腹時<br>3回      | 500g [ボトル]<br>2.0g×252包 [分包]   | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |
| 11<br>2022年9月改訂<br>(第1版)  | 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-M<br>本草製薬                | 16100AMZ04137000<br>1986年10月 | 7.5              | 1.6               | 乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム                | 顆粒 | H39                                      | A-1        | 食前又は食間<br>3回   | 500g (バラ包装)<br>[ボトル]<br>735g (2.5g×294包)<br>[分包]<br>105g (2.5g×42包)<br>[分包]                            | 6.0   | 3.0    | /     | 4.0 | /   | 2.0  |

【効能又は効果一覧】

|     |   |
|-----|---|
| A-1 | めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症：<br>神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛  |
| A-2 | めまい、ふらつきまたは動悸があり、尿量が減少するものの次の諸症：<br>神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛   |
| B   | 立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。<br>神経性心臓亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。 |
| C   | 頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心臓亢進などがあって不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるものの次の諸症<br>神経性心臓亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患 |