

功能和效果

用於中等體力以下、感到上火、肩酸、容易疲勞、精神不穩定或有焦慮等精神神經症狀、時有便秘傾向人士的以下各種症狀：

畏寒怕冷、體質衰弱、月經不調、月經困難、更年期障礙、女性荷爾蒙失調症^(注)、失眠症

注) 女性荷爾蒙失調症是指伴隨月經、懷孕、分娩、產後、更年期等女性的荷爾蒙變化而出現的精神不穩定或焦慮等精神神經症狀及身體症狀



使用注意事項

禁止事項

以下人士請勿服用：
出生後未滿 3 個月嬰兒

諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - 孕婦或疑似懷孕的人士
 - 腸胃弱的人士
 - 老年人
 - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
 - 有以下症狀的人士：
 - 浮腫
 - 被診斷為患有以下疾病的人士：
 - 高血壓、心臟病、腎臟病
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	噁心或嘔吐、食欲不振、胃部不適

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等
腸系膜靜脈硬化	由於長期服用、反復出現腹痛、腹瀉、便秘、腹脹感等

- 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
腹瀉
- 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

當歸、芍藥、白朮 或 蒼朮、茯苓、柴胡、牡丹皮、山梔子、甘草、生薑、薄荷葉

* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學