

**功能和效果**

可用於各種體力、喉嚨腫脹疼痛的人士的以下各種症狀：  
扁桃體炎、扁桃體周圍炎

**使用注意事項****禁止事項**

以下人士請勿服用：  
出生後未滿 3 個月嬰兒

**諮詢事項**

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
  - 正在接受醫生治療的人士
  - 孕婦或疑似懷孕的人士
  - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
  - 腸胃弱、容易腹瀉的人士
  - 老年人
  - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
  - 有以下症狀的人士：
    - 浮腫
  - 被診斷為患有以下疾病的人士：
    - 高血壓、心臟病、腎臟病
- 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振、胃部不適

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強

- 如果服用 5-6 日症狀仍未好轉，請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

**成份**

防風、牛蒡子、連翹、荊芥、羌活、甘草、桔梗、石膏



\* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。  
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

