

功能和效果

比較有體力、時有下腹疼痛、肩酸、頭沉、眩暈、上火且腳冰冷等症人士的以下各種症狀：

月經不調、月經異常、痛經、更年期障礙、女性荷爾蒙失調症、肩酸、眩暈、頭沉、跌打損傷（碰撞挫傷症）、凍傷、斑點、濕疹或皮膚炎、暗瘡

使用注意事項

禁止事項

以下人士請勿服用：
未滿 3 個月嬰兒

諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - 正在接受醫生治療的人士
 - 孕婦或疑似懷孕的人士
 - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
 - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

- 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
腹瀉
- 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉，請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

桂皮、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍藥



* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

