

功能和效果

用於中等體力以下、容易疲勞、容易四肢冰冷、尿量減少、浮腫、時有口渴的人士的以下各種症狀：
下肢疼痛、腰痛、麻痺、老年人視物模糊、瘙癢、排尿困難、尿頻、浮腫、
伴隨高血壓改善的症狀（肩酸、頭沉、耳鳴）

使用注意事項**禁止事項**

以下人士請勿服用：
出生後未滿 3 個月嬰兒

諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - (1) 正在接受醫生治療的人士
 - (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
 - (3) 腸胃弱、容易腹瀉的人士
 - (4) 易上火、面色赤紅並體力充沛的人士
 - (5) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振、胃部不適、腹痛
其他	心悸、上火、嘴唇或舌頭發麻

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難、出現乾咳、發熱等症狀、此類症狀會突然出現或持續
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

- 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
腹瀉
- 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

地黃、山茱萸、山藥、澤瀉、茯苓、牡丹皮、桂皮、加工附子、牛膝、車前子



* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

