

功能和效果

可用於各種體力、口渴且尿量少的人士伴隨有眩暈、噁心、嘔吐、腹痛、頭痛、浮腫等某種症狀的以下各種症狀：
水樣性腹瀉、急性腸胃炎（裡急後重的症狀不要服用）、中暑、頭痛、浮腫、宿醉

使用注意事項

禁止事項

以下人士請勿服用：
出生後未滿 3 個月的嬰兒

諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - 正在接受醫生治療的人士
 - 孕婦或疑似懷孕的人士
 - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢

- 如果服用 1 個月左右（針對急性腸胃炎、宿醉服用時則服用 5-6 次、針對水樣性腹瀉、中暑服用時則服用 5-6 天）
症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

澤瀉、猪苓、茯苓、蒼朮 或 白朮、桂皮



* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學