

## 功能和效果

用於中等體力以上、精神不安、伴隨心悸、失眠、便秘等的人士的以下各種症狀：  
高血壓的伴隨症狀（心悸、不安、失眠）、神經症、更年期神經症、小兒夜啼、便秘

## 使用注意事項

## 禁止事項

- 以下人士請勿服用：  
出生後未滿 3 個月的嬰兒
- 服用本藥的期間、不要服用下列藥品：  
別的瀉藥（通便劑）
- 哺乳中的人不服用本劑、服用本劑的情況避開哺乳

## 諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
  - 正在接受醫生治療的人士
  - 孕婦或疑似懷孕的人士
  - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
  - 腸胃弱、容易腹瀉的人士
  - 老年人
  - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
  - 有以下症狀的人士：  
浮腫
  - 被診斷為患有以下疾病的人士：  
高血壓、心臟病、腎臟病
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難、出現乾咳、發熱等症狀、此類症狀會突然出現或持續
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

- 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：  
軟便、腹瀉
- 如果服用 1 個月左右（針對小兒夜啼、便秘服用時則為 1 周左右）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

## 成份

柴胡、半夏、茯苓、桂皮、大棗、人參、龍骨、牡蠣、生薑、（大黃、黃芩、甘草）

\* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。  
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

