

功能和效果

用於體力虛弱的人士的以下各種症狀：

病後・術後體力下降、疲勞倦怠、食欲不振、盜汗、手脚發冷、貧血

使用注意事項

禁止事項

以下人士請勿服用：

出生後未滿 3 個月的嬰兒

諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 腸胃弱的人士
- (4) 老年人
- (5) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- (6) 有以下症狀的人士：

浮腫

(7) 被診斷為患有以下疾病的人士：

高血壓、心臟病、腎臟病

2. 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	胃部不適

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

3. 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
腹瀉

4. 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

5. 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

人參、黃耆、白朮或蒼朮、茯苓、當歸、芍藥、地黃、川芎、桂皮、甘草



* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

