

功能和效果

用於中等體力、時有胸脅苦滿、食欲不振或口苦、舌上白苔的人士的以下各種症狀：
食欲不振、噁心、胃炎、胃痛、腸胃弱、疲勞感、感冒後期的各種症狀

使用注意事項**禁止事項**

以下人士請勿服用：
出生後未滿 3 個月嬰兒

諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - 正在接受醫生治療的人士
 - 孕婦或疑似懷孕的人士
 - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
 - 老年人
 - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
 - 有以下症狀的人士：
 - 浮腫
 - 被診斷為患有以下疾病的人士：
 - 肝臟病、高血壓、心臟病、腎臟病
 - 正在接受干擾素製劑治療的人士
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
其他	尿頻、小便刺痛、血尿、殘尿感

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難、出現乾咳、發熱等症狀、此類症狀會突然出現或持續
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

- 如果服用 1 個月左右（針對感冒後期各種症狀服用時則服用 1 周左右）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

成份

柴胡、半夏、生薑、黃芩、大棗、人參、甘草



* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

