

## 功能和效果

用於身體強壯、從側腹到胸口有不適、有便秘傾向的人士的以下各種症狀：  
胃炎、習慣性便秘、高血壓或肥胖所伴隨的肩酸、頭痛、便秘、神經症、肥胖症

## 使用注意事項

## 禁止事項

- 以下人士請勿服用：  
出生後未滿 3 個月嬰兒
- 服用本藥劑的期間、請勿服用以下藥品：  
其他瀉藥
- 哺乳期的女士請勿服用本藥劑、或者服用本藥劑期間請勿哺乳

## 諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
  - 正在接受醫生治療的人士
  - 孕婦或疑似懷孕的人士
  - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
  - 腸胃弱、容易腹瀉的人士
  - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難、出現乾咳、發熱等症狀、此類症狀會突然出現或持續
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

- 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：  
腹瀉
- 如果服用 1 個月左右（針對習慣性便秘、高血壓或肥胖伴隨的便秘服用時則為 5-6 天）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

## 成份

柴胡、半夏、生薑、黃芩、芍藥、大棗、枳實、大黃



\* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。  
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學