

## 功能和效果

用於中等體力以上，上火且經常便秘的人士的以下各種症狀：  
月經不調、月經困難症、痛經、月經時或產後的精神不穩定、腰痛、便秘、  
高血壓的伴隨症狀（頭痛、眩暈、肩酸）、痔瘡、碰撞挫傷症

## 使用注意事項

### 禁止事項

- 以下人士請勿服用：  
出生後未滿 3 個月嬰兒
- 服用本藥劑的期間、請勿服用以下藥品：  
其他瀉藥
- 哺乳期的女士請勿服用本藥劑、或者服用本藥劑期間請勿哺乳

### 諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
  - 正在接受醫生治療的人士
  - 孕婦或疑似懷孕的人士
  - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
  - 腸胃弱、容易腹瀉的人士
  - 老年人
  - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
  - 有以下症狀的人士：  
浮腫
  - 被診斷為患有以下疾病的人士：  
高血壓、心臟病、腎臟病
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、 並逐漸增強

- 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：  
腹瀉
- 如果服用 1 個月左右（針對便秘服用時則為 5-6 天）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 服用本劑後、如出現意外出血時、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

## 成份

桃仁、桂皮、大黃、芒硝、甘草



\* 關於本藥，如果還有在意的地方，請諮詢醫生，藥劑師或者註冊銷售者。  
監修：陳福士 博士 醫療商業藥學系 教授 日本藥科大學

